

Naturnummer	Naturtype	Beskrivelse	Bemærkning
1	Eng	Engarealet er fugtigt med flere områder, hvor der står sjapvand på terræn. Arealet er domineret af arter af græs og er generelt artsfattigt. Der er få stjernearter om engkarse og hyldebladet baldrian. På delområder er græsset slået og på andre, er arealet forsøgt slået, men opgivet på grund af vand på terræn. Arealet har en naturtilstand fra moderat til ringe.	Kørespor og en smule randpåvirkning af den sydlige del.
2	Eng	Engarealet har et godt naturpotentiale med delområder med fin og artsrig natur. Der er dele i den centrale til sydlige del, som er fugtig til våd med arter som almindelig og grå star, eng-kabbeleje og almindelig mjøldurt og spids spydmos. Der er ved besigtigelsen ingen tegn på, at arealet plejes. De andre dele af arealet er lettere næringspåvirket fra vej og de omkringliggende arealer i omdrift. Arealet har en moderat naturtilstand.	
3	Eng	Arealet har terrænvariationer, som bevirker, at det veksler mellem fugtige til våde lavninger og mere tørre dele. Der er et areal, som er skovdækket, hvor der er flere potentielle levesteder for arter af flagermus. Almindelig mjøldurt dominerer store dele af engen. Der er et mindre afgrænset område med kær-star, som er meget våd med gyngende grund. Arealet har en moderat naturtilstand.	Flere mose-karakterer, som det skovbevoksede areal. Høj jagtinteresse og der er delvist slået en sti igennem arealet, hvor der er fodertønder, skure og vildtkamera.
4	Eng	Engen er næringspåvirket og artsfattig. Fugtig til våd flere steder. Engen afgræsses af kvæg. Arealet har en ringe naturtilstand.	

5	Sø/vandhul	Søen er næsten tilgroet med bred dunhammer, og der er en ø i midten med pilekrat, birk og anemoner. Der er frit vandspejl enkelte steder. Søen er næringsrig med liden andemad på overfladen. Søen har en ringe til dårlig naturtilstand.	
6	Mose	Mosens areal er flere steder domineret af et tæt pilekrat. Der er flere potentielle levesteder for arter af padder, hvor der i vandsamlingen i den nordøstlige ende er registreret fund af mange haletudser. Der blev observeret flere individer af butsnudet frø. Arealet grænser op til et ryddet areal, hvor der henligger flere bunker med grene. Arealet har en moderat estimeret naturtilstand.	
7	Eng	Engen er fugtig til våd og domineres af arter af græs og mælkebøtter. Arealet er hegnet, men der er ingen dyr ved besigtigelsen. Randpåvirket. Arealet har en ringe naturtilstand.	
8	Mose	Arealet er domineret af et stort pilekrat, hvor der er vand på terræn under pilene. Arealet er artsfattigt, og domineret af rørgræs og stor nælde. En smule randpåvirket. Arealet har en ringe naturtilstand.	
9	Eng	Arealet er fugtigt til vådt og næringspåvirket. Der er flere steder, som er okkerpåvirket. Arealet er hegnet, men der er ingen dyr ved besigtigelsen.	Der er en gammel højspændingsledningsmast på arealet, som ved besigtigelsen står under vand.

		Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	
10	Findes ikke	Er ved en fejl hoppet over nr. 10. i nummeringen	
11	Sø/vandhul	Det er ved besigtigelsen ikke muligt at se et frit vandspejl, totalt tilgroet. Søen er et potentielt levested for arter af padder, men der blev ikke registreret fund af padder ved besigtigelsen. Søen er næringspåvirket fra vej og de omkringliggende arealer i omdrift. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	
12	Eng	Generelt en våd eng med sjapvand og liden andemad flere steder. Engen er tilgroet med arter af græs, mosebunke, fløjlsgræs og draphavre. Der er enkelte afgrænsede områder med almindelig star og hare-star, mangeblomstret frytle og kær-tidsel. Den sydligste del er tilgroet med pil. Arealet afgræsses delvist med et lavt græsningstryk. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	
13	Overdrev	Overdrevet er tilgroet med arter af græs, men med en nogenlunde struktur. Der er et relativt godt naturpotentiale med arter som blåhat, djævelsbid, mangeblomstret frytle, mark-frytle, vellugtende gulaks, almindelig kamgræs, gul snorre, rødknæ og almindelig kongepen, hvor flere af arterne indikerer sur bund. Arealet er truet af tilgroning. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	
14	Sø/vandhul	Søen er okkerpåvirket, orange og ildelugtende.	Ikke paddepotentiale, da der er strømning igennem søen.

		Søen er omkranset af rød-el og pil og er meget grumset. Der er registreret dynd-padderok, bukkeblad og bredbladet dunhammer. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	
15	Mose	Arealet er domineret af et tæt pilekrat, hvor der flere steder er sjapvand på terræn, som er okkerpåvirket. Der er flere potentielle levested for arter af flagermus og padder. Arealet er hegnet, men der er ved besigtigelsen ingen dyr. Der er høj aktivitet af vandnymfer og guldsmede. Der er på grænsen af mosens sydlige del fundet trævelekrone og stjerne-star. Arealet har en moderat naturtilstand.	Afgrænsningen af mosen kan udvides mod syd, hvor arealet er fugtigt til vådt med arter som stjerne-star og trævelekrone. Tjek historik på omkringliggende arealer, umiddelbart ligger de hen og der er et fint potentiale til natur.
16	Eng	Arealet er domineret af mose-bunke og knæbøjet rævehale. Der er våde afgrænsede områder med tykbladet ærenpris. Terrænet stiger, og der er registreret overdrevsarter på skrænten såsom håret høgeurt, lyng-snerre og vellugtende gulaks. Arealet er hegnet, men der var ingen dyr ved besigtigelsen. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	
17	Sø/vandhul	Søen er delvist tilgroet med lodden dueurt og bredbladet dunhammer. Delvist frit vandspejl og fint potentiale til arter af padder, da der er mange skjulesteder. Der blev registreret mange små brune frøer. Næringspåvirket fra arealer omkring og fra vejen. Arealet har en moderat naturtilstand.	
18	Eng	Store dele af engen er domineret af mose-bunke. Arealet afgræsses af kvæg. Der er flere våde områder, som kvægene undgår.	

		Arealet har en moderat naturtilstand.	
19	Mose	Arealet er domineret af et tæt pilekrat, hvor der er få lysninger. Arealet er fugtigt til vådt med sjapvand. Der blev registreret eng-nellikerod, dynd-padderok og trævlekrone i én af lysningerne. Arealet har en moderat naturtilstand.	
20	Eng	Engen er delvist afgræsset, og er fugtig til våd. Størstedelen af arealet er domineret af mose-bunke. Arealet er tilgroet. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	
21	Mose	Mosen er skovbevokset med flere potentielle levesteder for arter af flagermus. Der er et lille område med bævreasp og dunbirk, og de resterende dele er domineret af et tæt pilekrat. Arealet afgræsses af kvæg. Arealet har en moderat naturtilstand.	
22	Eng	Arealet er heget, men der var ingen dyr ved besigtigelsen. Arealet er fugtigt til meget vådt. Domineres af mose-bunke og lyse-siv. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	
23	Eng	Arealet er heget, men der var ingen dyr ved besigtigelsen. Der er i den vestlige del et afgrænset område med eng-nellikerod. Arealet er tilgroet med arter af græs. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	
24	Eng	Arealet er heget, men der var ingen dyr ved besigtigelsen. Arealet er tilgroet med arter af græs og er fugtigt til meget vådt. Arealet har en ringe naturtilstand.	
25	Eng	Engen har både våde områder og mere tørre områder, og er domineret af hyldebladet baldrian, almindelig mjødurt,	

		lodden dueurt, ager-tidsel og et par skovstar. Det resterende tørre areal er tilgroet med græs. Der er i den sydøstlige del slået en sti igennem arealet. Mange hvilepladser til vildt i det høje græs. Høj vandnymfeaktivitet. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	
26	Eng	Arealet er tilgroet med rørgræs og er fugtigt til meget vådt. Slået stisystem ved eng, mose og sø. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	
27	Sø/vandhul	Søen er indhegnet med et andehus. Liden og kors andemad dominerer overfladen. Søen er lysåben, og der er registreret fund af padder, brune frøer og skrubtudser. Høj vandnymfeaktivitet. Den vestlige del er tæt på udtørret dog med sjapvand, hvor almindelig sumpstrå dominerer. Arealet har en moderat naturtilstand.	
28	Mose	Der er et slået stisystem igennem mosen. Store jagtinteresser med flere fodertønder, skydepladser og vildtkamera. Store dele af mosen er skovbevokset med birk, hylde, rød-el, og gran hist og pist, hvor der tættest mod søen er et spot med kragefod og tormentil. Der er flere potentielle levesteder for arter af flagermus. Høj vandnymfeaktivitet. Der er flere våde arealer mod øst med bredbladet dunhammer, rørgræs og eng-rørhvene og vandsamlinger, som er potentielle levested for arter af padder. Arealet har en moderat naturtilstand.	

29	Sø/vandhul	Søen har flere mindre øer og formet som et ottetal. En sangsvane blev registreret. Der var skydetårn og andehuse i tilknytning til søens areal. Haletudser registreret ved broen, hvor der er mere vegetation, læ og lavt vand, som hurtigere varmes op. Der var høj aktivitet af vandnymfer og guldsmede. Arealet har en moderat naturtilstand.	
30	Eng	En langstrakt og meget våd eng. Der var en høj vandnymfe- og guldsmedeaktivitet, samt mange hvilepladser til vildt. Der er mod øst et lille område med gul iris. Store dele af arealet er domineret af rørgræs og agertidsel. Flere områder domineres af star-skove, kær-snerre og kær-galtetand. Der ses en tydelig randpåvirkning mod nord, hvor skvalderkål og hindbær dominerer. Arealet har en moderat naturtilstand.	Mose-karakter.
31	Eng	Et lille tørt område med mose-bunke og hindbærkrat. Arealet er randpåvirket. Der er tegn på, at dele har stået under vand, men ved besigtigelsen var arealet tørt. Der er ved besigtigelsen ikke registreret tegn på pleje af arealet. Arealet har en ringe til dårlig naturtilstand.	Nord for arealet, er der et skovbevokset areal med flere potentielle levesteder for arter af flagermus.
32	Eng	Arealet er tørt og skovbevokset, som domineres af et pile-hindbærkrat med lysninger med tormentil. Flere potentielle levesteder for arter af flagermus. Arealet har en ringe naturtilstand.	Mose-karakter.

33	Mose	Arealet har flere potentielle levesteder for arter af flagermus. Der er større mængder af dødt ved. Der findes et tørt og surt areal, som kan registreres som birkemose. Arealet har en moderat naturtilstand.	Afgrænsningen af mosen kan udvides mod sydvest med det skovbevoksede areal (en del af den nuværende eng).
34	Overdrev	Arealet er tilgroet med arter af græs og ingen tegn på pleje af arealet. Der er potentiale for et surt overdrev, da arter som bølget-bunke, eg, mangeblomstret-frytle, hindbær og græsbladet fladstjerne indikerer sur bund. Arealet har en ringe naturtilstand.	
35	Eng	Arealet er meget randpåvirket og tilgroet. Flere vandsamlinger på terræn, et lille område med næbstar. Vandsamlingerne er potentielle rastested/levested for arter af padder. Arealet har en ringe naturtilstand.	
36	Eng	Arealet er fugtigt til meget vådt flere steder. Mange hvilepladser til vildt i det høje græs. Der er enkelte små områder (sydøst) med kær- og hare-star, sump kællingetand og almindelig mjørdurt. Terrænet stiger mod øst mod arealer i omdrift. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	
37	Sø/vandhul	Søen er tilgroet, hvor der er ca. 50 cm vand. Kær- og næb-star dominerer dele af søen. Høj vandnymfe- og guldsmedeaktivitet. Søen har paddepotentiale, men der blev ikke registreret fund ved besigtigelsen. Arealet har en moderat naturtilstand.	
38	Sø/vandhul	Søen er stor og der blev registreret fund af padder i og i tæt tilknytning til søens brink. Mange små brune frøer, formentlig butsnudet frø og skrubbudser. Omkranset af pil. Arealet har en moderat naturtilstand.	Mellem sø nr. 38 og 39 henligger muligvis materiale fra da søerne blev gravet.

39	Sø/vandhul	Der blev i søen registreret fund af padder, haletudser i og i tæt tilknytning til søen. Høj vandnymfe- og guldsmede-aktivitet. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	
40	Sø/vandhul	Der blev i søen registreret fund af padder, haletudser i og i tæt tilknytning til søen. Høj vandnymfe- og guldsmedeaktivitet. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	
41	Eng	Arealet er domineret af græsser. Store dele af arealet er tørt. Mange hvilepladser til vildt i det høje græs. Der er pletvis små våde områder. Arealet er randpåvirket. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	Der er et skovbevokset areal mod sydvest, hvor der er flere potentielle levesteder for arter af flagermus.
42	Mose	Arealet er et tæt tilgroet pilekrat og arealet under pilene er okkerpåvirket. Der er i den østlige del registreret fund af haletudser i det stillestående vand i grøften. Arealet er tilgroet med tagrør og rørgræs på de lysåbne arealer. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	
43	Eng	Engen er generelt tør, men med få våde områder, hvor der er sjapvand på terræn, hvor manna sødgræs og rørgræs dominerer. Der er vandnymfe- og guldsmedeaktivitet. Arealet har en ringe naturtilstand.	
44	Sø/vandhul	Lysåben sø med registrering af padder og haletudser. En høj vandnymfe- og guldsmedeaktivitet.	

		Arealet har en moderat naturtilstand.	
45	Mose	Fin og våd mose i lavning omkring søen. Arealet domineres af lodden dueurt, som en bræmme, hvor den centrale del af mosen er domineret af næb-star, kragefod og trævlekrone. Arealet har en god til moderat naturtilstand.	
46	Eng	Engen er tilgroet med både tørre og våde spots. Arealet er heget, men der var ingen dyr ved besigtigelsen. Der er høj vandnymfe aktivitet. Der er mange hvilepladser til vildt i det høje græs. Arealet er randpåvirket. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	
47		Arealet afgræsses af heste, og der er et højt græsningstryk. Enkelte store sten og en fin struktur på store dele af arealet, men ved den nordvestlige del er overdrevet forstyrret og påvirket og i en meget dårlig tilstand. Der er et lille område med almindelig brunelle, femhannet hønsetarm og andre fine overdrevsarter som blåhat, blåmunke og djævelsbid hist og her. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	Nordvest for undersøgelsesområdet (udenfor undersøgelsesområdet) ses et potentielt levested for markfirben. Det er en skrænt med et fladt område med løst sand, ved besigtigelsen optrådt af heste på det flade areal. 

48	Eng	Arealet er fugtigt til mere vådt og med sjapvand på terræn flere steder. Der er en høj vandnymfeaktivitet. Mange hvilepladser til vildt i det høje græs. Fugtigt delområde med glanskapslet siv, grøn star, stjerne star, kær tidsel, almindelig brunelle, lyng snerre og eng nellikerod. Arealet er delvist afgræsset af heste, hvor størstedelen dog er uden pleje og tilgroet med rørgræs og et tæt pilekrat. Arealet er randpåvirket. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	Muligvis tegn på bæver, da der er flere grene, som er bidt over. Der er mod nord registreret bjørneklo.
49	Eng	Arealet er fugtigt til vådt og domineret af mose-bunke. Store dele af arealet er med sjapvand på terræn, hvor vandstjerne og trådalger dominerer på vandsamlingernes overflade. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	Læhegn med potentielle levesteder for arter af flagermus grænser op til eng nr. 49 og 50.
50	Eng	Arealet afgræsses ikke, og det er tilgroet med rørgræs og stor nælde, hvor det flere steder er randpåvirket. Arealet har en moderat til ringe naturtilstand.	Eng nr. 36 og 50 kan samles til et stort engareal, da de begge domineres af rørgræs m.m.