Værd at vide – til tandlæger

Ordination af afhængigheds-skabende lægemidler



Det er ikke risikofrit at behandle med afhængighedsskabende lægemidler og bør ikke være førstevalg. Vurdér, om det er muligt at undgå og i stedet ordinere andre lægemidler, som ikke er afhængighedsskabende.

Opmærksomhedspunkter

Hvornår er ordination af afhængighedsskabende lægemidler aktuelt?

Når patienten har stærke smerter, fx i forbindelse med større behandlinger og operationer, hvor paracetamol og/eller NSAID ikke smertedækker tilstrækkeligt, kan der være brug for fx at ordinere opioider.

Det kan også være nødvendigt at ordinere benzodiazepiner fx i forbindelse med angst for behandlingen. I så fald skal du anvende lavest mulige dosis.

Overvejelser inden du ordinerer

Kontakt patientens praktiserende læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er kontraindikationer, eller hvis den praktiserende læge skal overtage behandlingen.

Hvad er den forventede effekt, og hvilke uønskede virkninger kunne der være?

Er patienten i særlig risiko for at udvikle afhængighed eller bivirkninger? Fx hvis patienten:

- Er ældre
- Har demens
- Har faldtendens
- Har nedsat lunge- eller nyrefunktion
- Har eller har haft et misbrug
- Allerede er i behandling med afhængighedsskabende lægemidler

Hvad er patientens aktuelle medicinstatus? Vær bl.a. opmærksom på eventuelle privatmarkerede medicinordinationer

Kan behandlingen påvirke patientens evne til fx at køre bil eller føre maskiner?

Når du ordinerer

Hvis du undtagelsesvis ordinerer afhængighedsskabende lægemidler, skal du:

- Vælge mindstepakninger
- Vælge et præparat med kort halveringstid
- Kun udstede én recept én gang
- Informer patienten om risikoen for afhængighed og hyppige og/eller alvorlige bivirkninger
- Få patientens informerede samtykke
- Overvej, om egen læge skal inddrages i behandlingen

Journalfør

- Indikation for behandling
- Forventet effekt
- Dosis
- Varighed
- Forventede bivirkninger
- Hvad patienten er informeret om
- Aftaler med patienten, fx hvornår egen læge skal kontaktes
- Patientens samtykke
- Lægeligt kørselsforbud

Opbevaring

Opbevar så få afhængighedsskabende lægemidler som muligt i din klinik – forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

Læs mere

Scan QR-koden eller besøg stps.dk/asl.

STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED