




ANALYSE

2018

Pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet 2013-2016

For pakkeforløb medtaget i monitorering af
kræftområdet
Opgørelse OF₄ samlet tid til initial behandling



**SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN**

Indholdsfortegnelse

Analyse af de pakkeforløb, hvor forløbstiden var længere end anbefalet 2013-2016	1
1. Baggrund	4
2. Læsevejledning	4
3. Hovedresultater	8
4. Pakkeforløb for brystkræft	13
5. Pakkeforløb for lungekræft	16
6. Pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm	19
7. Pakkeforløb for hoved- og halskræft	22
8. Pakkeforløb for blærekræft	25
9. Pakkeforløb for nyrekræft	28
10. Pakkeforløb for prostatakræft	31
11. Pakkeforløb for livmoderkræft	35
12. Pakkeforløb for kræft i æggestok	38
13. Pakkeforløb for modernærkekræft i hud	41
14. Pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	44
15. Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen	47
16. Pakkeforløb for spiserøret, mavemunden og mavesækken	50
Bilag 1 Metode	53
Bilag 2 Pakkeforløb	59
Bilag 3 Dataopgørelser – brystkræft	61
Bilag 4 Dataopgørelser – lungekræft	64
Bilag 5 Dataopgørelser – kræft i tyk- og endetarm	67
Bilag 6 Dataopgørelser – hoved- og halskræft	70
Bilag 7 Dataopgørelser – blærekræft	73
Bilag 8 Dataopgørelser – nyrekræft	76
Bilag 9 Dataopgørelser – prostatakræft	79
Bilag 10 Dataopgørelser – livmoderkræft	82
Bilag 11 Dataopgørelser – kræft i æggestok	85
Bilag 12 Dataopgørelser – modernærkekræft i hud	88
Bilag 13 Dataopgørelser – lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	91
Bilag 14 Dataopgørelser – kræft i bugspytkirtlen	94

Bilag 15 Dataopgørelser – kræft i spiserøret, mavemunden eller mavesækken	97
Bilag 16 Dataopgørelser – kræft i galdegang	100
Bilag 17 Dataopgørelser – primær leverkræft.....	102
Bilag 18 Dataopgørelser – akut leukæmi / fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	104
Bilag 19 Dataopgørelser – kræft i penis	106
Bilag 20 Dataopgørelser – kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)	108
Bilag 21 Dataopgørelser – livmoderhalskræft.....	110
Bilag 22 Dataopgørelser – kræft i hjernen	112

1. Baggrund

For at kvalificere dialogen i Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet vedrørende monitorering af pakkeforløb for kræftområdet for det organspecifikke kræftområde har Sundhedsdatastyrelsen sat fokus på de forløb, der er medtaget i opgørelse af 'samlet tid til behandling OF4', der anvendte flere dage i forløb ud over det antal dage, der er angivet som anbefalede forløbstider for de specifikke kræftformer med tilhørende behandlingsformer, se *boks 1*.

Boks 1. Samlet tid til behandling OF4

'Samlet tid til behandling OF4' for pakkeforløb for kræftområdet opgøres for perioden fra henvisning modtaget til start af pakkeforløb AFBxxA til start initial behandling AFBxxF*. Initial behandling kan være kirurgisk behandling herunder nervebesparende kirurgi ved prostatakræft, medicinsk behandling (kemoterapi) og strålebehandling, se *bilag 1*.

xx erstatter de specifikke pakkeforløbsnumre fra 1-33, se *bilag 2*.

Opgørelsen foretages for hvert kræftområde i et samlet hele uanset behandlingsformer.



Analysen ser på perioden 2013-2016, hvor 2013 er det første hele år, hvor nuværende monitoreringsmodel er blevet anvendt, og 2016 er sidste år, hvor det er muligt at medtage det fulde år i en analyse af forløbstid for alle medtagne pakkeforløb. Data henhøres til sygehusregion og år ud fra tidspunkt for start af pakkeforløbene, se *bilag 1*.

I samarbejde med Sundhedsstyrelsen er metode for opgørelse blevet defineret, hvor forløb med anvendelse af dage ud over anbefalede forløbstider opgøres med visning af antal og andel pakkeforløb, der har anvendt 1-3 dage, 4-7 dage, 8-15 dage og 16+ dage ud over anbefalede forløbstider. Ligeledes angives gennemsnitlig forløbstid og tid i dage for median forløbet for den yderligere anvendte forløbsperiode. Dette suppleres med forløbstid i dage for nedre og øvre kvartil for denne periode af forløbene. Desuden vises det minimale og maksimale antal anvendte dage i forløb i sin helhed.

2. Læsevejledning

Nærværende notat sætter fokus på, i hvilken grad pakkeforløb for kræftområdet har anvendt flere dage i forløb end de anbefalede forløbstider for den enkelte kræfttype med tilhørende

behandlingsformer. Der skal være opmærksomhed på, at der kan være relevante sundhedsfaglige grunde til længere forløbstider end de anbefalede forløbstider for de enkelte kræftområder.

Notatet fokuserer på de kræftformer, hvor der med belæg i antallet af forløb er muligt at beskrive kræftområdet, såsom brystkræft, lungekræft, kræft i tyk- og endetarm, hoved-halskræft, blærekræft, nyrekræft, prostatakkræft, livmoderkræft, kræft i æggestok, modermærkekræft i hud, lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi samt bugspytkirtelkræft og kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken. Analysen beskriver kræftområderne i nævnte rækkefølge. Bagvedliggende tal vises i bilag 3 - 15.

Grundet volumen af data vil følgende kræftområder alene blive vist for hele landet i bilag 16 – 22, men vil ikke indgå i selve analysen: akut leukæmi / fremskreden myeloplastisk syndrom (MDS), kræft i galdegang, primær leverkræft, kræft i penis, kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva), livmoderhalskræft og kræft i hjernen.


Øvrige kræfttyper medtaget i regi af pakkeforløb for kræftområdet, hvor antallet af forløb er meget lavt, vises ikke i denne analyse. Derudover indgår pakkeforløb uden anbefalet forløbstid for indikatoren 'samlet tid til behandling' ej heller. Samlet drejer det sig om følgende pakkeforløb: myelomatose, kroniske myeloide sygdomme, testikelkræft, kræft i øje og orbita, sarkomer i knogle og bløddele, analkræft, kræft i nyrebækken eller urinleder, lungehindekræft samt kræft hos børn. Ligeledes medtages pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren ej heller, da populationen for dette pakkeforløb i en vis udstrækning overlapper populationen for pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft.

For det enkelte pakkeforløb for kræftområdet vises

- antal og andel pakkeforløb gennemført inden for anbefalede forløbstider
- antal og andel forløb, hvor forløbet er gennemført med anvendelse af mere end den anbefalede forløbstid i følgende grupper 1-3 dage, 4-7 dage, 8-15 dage samt 16+ dage
- gennemsnitlig forløbstid og tid i forløb for median forløbet i dage (se boks 2) for tiden anvendt ud over de anbefalede forløbstider
- minimale og maksimale forløbstid i dage for tiden ud over de anbefalede forløbstider
- tid i forløb udover anbefalede forløbstider for 25 kvartil forløbet (nedre) og 75 kvartil forløbet (øvre) for hele landet (se boks 2)

Boks 2. Anvendte dage for 25 (nedre)-, 50 (median) - og 75 (øvre) kvartil forløbet udover anbefalede forløbstider

For forløb, hvor der er anvendt yderligere dage ud over anbefalede forløbstid, er 25 kvartil (nedre), 50 kvartil (median) og 75 kvartil (øvre) forløbet opgjort for forløbsperioden udover anbefalede forløbstider i dage.



Kvartilen angiver det antal dage, der maksimalt er anvendt ud over anbefalede forløbstid i forløb for de 25 procent, 50 procent henholdsvis 75 procent af forløbene, hvor denne forløbsperiode er kortest.

Dette betyder, at antal anvendte dage for nedre kvartil -, median - og øvre kvartil forløbet, angiver det antal dage, der adskiller de 25, 50 henholdsvis 75 procent af forløbene med den korteste forløbstid ud over de anbefalede forløbstider med de 75, 50 henholdsvis 25 procent af forløbene med den længste forløbstid ud over anbefalede forløbstider i dage (se bilag 1).

I bilag 1 findes metodebeskrivelse.

I bilag 2 kan ses en oversigt over pakkeforløb for kræftområdet for de organspecifikke kræfttyper med angivelse af anbefalede forløbstider for specifikke behandlingsformer.

I bilag 3-15 findes opgørelser for de kræftområder, der indgår i analysen. Desuden angives de anbefalede forløbstider ved tabeller og figurer.

Tal for øvrige kræftområder, hvor der ikke er udarbejdet en beskrivelse, kan ses i bilag 16-22.

Der gøres opmærksom på, at nærværende tal er opgjort uafhængigt af opgørelser udarbejdet i forbindelse med den kvartalsvise og årlige monitorering af kræftområdet. Derfor er det ikke muligt at sammenligne med tidligere offentliggjorte tal for området.

3. Hovedresultater

Pakkeforløb for kræftområdet

Generelt er forløbstiderne for pakkeforløb for kræftområdet blevet kortere over perioden uanset kræfttype, hvor andelen af forløb gennemført inden for de anbefalede forløbstider generelt var højere i 2016 end i 2013. Ligeledes ses, at den gennemsnitlige forløbstid og forløbstid for median forløbet generelt var kortere i 2016 sammenlignet med i 2013. Desuden ses, at antallet af forløb generelt steg over perioden med et højere antal pakkeforløb i 2016 i forhold til i 2013. Der ses variationer over de enkelte kræftområder, som kan ses nedenfor.

Pakkeforløb for brystkræft

Forløbstiden for pakkeforløb for brystkræft var generelt kortere i 2016 i forhold til i 2013.

Der var færre pakkeforløb i 2016 (3.527) end i de øvrige år 2013-2015 (cirka 4.000). Der ses en stigende andel forløb gennemført inden for anbefalede forløbstider fra 2013-2015 fra 69 til 81 procent med et efterfølgende fald til 79 procent i 2016. Af de forløb, der anvendte yderligere dage ud over den anbefalede forløbstid, ses et fald i antal og andel forløb, hvor der blev anvendt mere end 4 dage ekstra. Mens forløb med anvendelse af 1-3 dage yderligere var på nogenlunde samme niveau hvert af årene 2013-2016.

Det gennemsnitlige antal dage, der blev anvendt ud over de anbefalede forløbstider, blev halveret fra 39,3 dage i 2013 til 19,7 dage i 2016. Ligeledes faldt den yderligere forløbstid for median forløbet med to dage fra 9 i 2013 til 7 i 2016. Derudover faldt antallet af dage for øvre kvartil forløbet med 3 dage over perioden til 13 dage i 2016.

Pakkeforløb for lungekræft

Forløbstiden for pakkeforløb for lungekræft var generelt lidt kortere i 2016 i forhold til i 2014.

Antallet af pakkeforløb var højere i 2015 (3.531) og 2016 (3.359) end i 2013 (3.109). Andel forløb inden for anbefalede forløbstider steg vedvarende fra 2013 med 4 procentpoint til 75 procent i 2016. For de forløb, hvor der blev anvendt yderligere dage end de anbefalede forløbstider, ses et fald på omkring 1-2 procentpoint for antal og andel forløb over perioden, uanset om forløbene anvendte yderligere 1-3 dage, 4-7 dage, 8-15 dage eller 16+ dage. For forløb med anvendelse af 16+ dage ud over anbefalede forløbstid ses det største fald fra og med 2014 med 2,4 procentpoint til 9,9 procent i 2016.

Det gennemsnitlige antal dage, der blev anvendt ud over de anbefalede forløbstider, faldt med 13,9 dage fra 2014 til 32,6 dage i 2016. Forløbstiden for median forløbet var på nogenlunde samme niveau over perioden med 11-12 dage. Forløbsperioden for øvre kvartil forløbet faldt med 3 dage fra 2014 til 24 dage i 2016, hvilket var samme antal dage i 2013.

Pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft

Forløbstiden for pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft var generelt lidt kortere i 2016 i forhold til i 2013.

Det højeste antal pakkeforløb ses i 2014 og 2015 med lidt under 4.100 forløb, hvor antal forløb var 3.827 i 2016. Andelen af forløb, der blev gennemført inden for anbefalede forløbstider steg fra 77 procent i 2014 til 82 procent i 2016. For de forløb, der anvendte mere end anbefalede forløbstider, ses flest forløb i gruppen, der brugte mere end 16 dage, gældende for 9,3 procent af pakkeforløbene i 2014 med efterfølgende fald til 6,8 procent i 2016.

Det gennemsnitlige antal dage, der blev anvendt ud over de anbefalede forløbstider, blev mere end halveret fra 52,6 dage i 2013 til 22,3 dage i 2016. Forløbstiden for median forløbet var på nogenlunde samme niveau over perioden med 11-12 dage, hvorimod forløbsperioden for øvre kvartil forløbet faldt med 5 dage over perioden til 21 dage i 2016.

Pakkeforløb for hovedhalskræft

Forløbstiden for pakkeforløb for hovedhalskræft var generelt kortere i 2016 i forhold til i 2013.

Antallet af pakkeforløb steg fra 2014 (1.523) til omkring 1.800 i 2015 og 2016. Andel forløb gennemført inden for de anbefalede forløbstider steg vedvarende fra 55 procent i 2013 til 80 procent i 2016. Der ses et fald for andel forløb med yderligere anvendelse af 1-3 dage med 1,6 procentpoint, ved 4-7 dage med 4,2 procentpoint, ved 8-15 dage med 6,1 procentpoint samt ved 16+ dage med 13,0 procentpoint fra 2013-2016.

Det gennemsnitlige antal dage, der blev anvendt ud over de anbefalede forløbstider, faldt fra 39,1 dage i 2013 til 26,1 dage i 2016, dog med mellemliggende lavere værdier. Samtidigt faldt den yderligere forløbstid for median forløbet fra 12 dage i 2013 til 8 dage i 2016, og med forløbstid på 7 dage i de mellemliggende år. Desuden var forløbsperioden for øvre kvartil forløbet lavere i 2016 (16 dage) end i 2013 (23 dage), men er dog steget med 2 dage fra og med 2014.

Pakkeforløb for blærekræft

Forløbstiden for pakkeforløb for blærekræft var generelt kortere i 2016 i forhold til i 2013.

Der ses et vedvarende fald i antallet af pakkeforløb fra 773 i 2013 til 528 forløb i 2016. Andelen af forløb gennemført inden for anbefalede forløbstider faldt ligeledes fra 50 procent i 2013 til 40 procent i 2014 med efterfølgende stigning til 46 procent i 2016. Andelen af forløb med yderligere anvendelse af 1-3 dage, 4-7 dage og 8-15 dage steg over perioden. Mens andelen faldt for forløb, hvor der blev anvendt 16+ dage ud over anbefalede forløbstider, med 8,6 procentpoint fra 2014 (39,1 procent) til 2016 (30,5 procent).

Desuden ses et vedvarende fald i det gennemsnitlige antal dage, der blev anvendt ud over de anbefalede forløbstider, fra 55,4 dage i 2013 til 34,7 dage i 2016. Ligeledes faldt forløbstiden

for median forløbet fra 24 dage i 2013 til 17 dage i 2016, samtidigt ses et fald for øvre kvartil forløbet over perioden med 15 dage til 34 dage i 2016.

Pakkeforløb for nyrekræft

Forløbstiden for pakkeforløb for nyrekræft var generelt kortere i 2016 i forhold til i 2013.

Antallet af pakkeforløb steg fra 2013 (636) til 2015 (796) med et efterfølgende fald med 50 forløb til 2016. Andel forløb gennemført inden for anbefalede forløbstider steg vedvarende fra 59 procent i 2013 til 75 procent i 2016. For den overvejende andel af forløb gennemført med anvendelse af yderligere dage, blev der anvendt mere end 16 dage, hvor andelen af forløb dog faldt fra 27,2 procent i 2013 mod 13,8 procent i 2016.

Det gennemsnitlige antal dage, der blev anvendt ud over de anbefalede forløbstider, blev halveret over perioden fra 79,2 dage i 2013 til 38,9 dage i 2016. Desuden faldt forløbstiden for median forløbet fra 29 dage i 2013 til 18 dage i 2016, hvor perioden for øvre kvartil forløbet faldt med 27 dage fra 2013 (65 dage) til 2016 (38 dage).

Pakkeforløb for prostatakræft

Forløbstiden for pakkeforløb for prostatakræft var generelt kortere i 2016 i forhold til i 2013.

Antallet af pakkeforløb faldt fra cirka 1.320 i 2013 og 2014 til 1.097 i 2016. Andel forløb gennemført inden for anbefalede forløbstider steg vedvarende fra 34 procent i 2013 til 58 procent i 2016. Hovedparten af forløb, der blev gennemført med anvendelse af yderligere dage end anbefalede forløbstider, findes i gruppen, hvor der anvendes mere end 16 dage, dog faldt andelen af disse forløb fra 2013 (48,2 procent) til 26,9 procent i 2016. Andel forløb i de etablerede grupper med anvendelse af 1-15 dage er faldet minimalt over perioden.

Desuden blev det gennemsnitlige antal dage, anvendt ud over de anbefalede forløbstider, næsten halveret over perioden fra 88,9 dage i 2013 til 44,7 dage i 2016. Forløbsperioden for median forløbet faldt ligeledes over perioden fra 37 dage (2013) til 25 dage i 2016. Derudover faldt perioden for øvre kvartil forløbet med 28 dage til 50 dage i 2016.

Pakkeforløb for livmoderkræft

Forløbstiden for pakkeforløb for livmoderkræft var generelt kortere i 2016 i forhold til i 2013.

Antallet af pakkeforløb faldt vedvarende fra 793 i 2013 til 670 i 2016. Andel forløb, der blev gennemført inden for anbefalede forløbstider, steg vedvarende fra 67 procent i 2013 til 83 procent i 2016. Ligeledes ses mere end en halvering af antallet af forløb, der blev gennemført med anvendelse af yderligere dage. I 2013 findes en jævnt fordeling af hovedparten af disse forløb med cirka 70 forløb i hver af grupperne med yderligere anvendelse af 4-7 dage, 8-15 dage samt 16+ dage. Mens det højeste antal af disse forløb i 2016 (40) anvendte yderligere 4-7 dage. Andelen af forløb med yderligere dage faldt desuden inden for hver af de definerede grupper over perioden.

Den gennemsnitlige forløbstid ud over de anbefalede forløbstider faldt ligeledes fra 15,5 dage i 2013 til 12,7 dage i 2016. Forløbsperiode for median forløbet var ligeledes kortere i 2016 (7

dage) sammenlignet med i 2013 (9 dage). Perioden for øvre kvartil forløbet faldt ligeledes fra 16 dage i 2013 til 13 dage i 2015 og 2016.

Pakkeforløb for kræft i æggestok

Forløbstiden for pakkeforløb for kræft i æggestok var generelt kortere i 2016 i forhold til i 2013.

Der ses et fald i antal pakkeforløb fra 785 i 2013 til 662 i 2016. Andel forløb, der blev gennemført inden for anbefalede forløbstider, steg fra 67 procent i 2013 til 77 procent i 2015 efterfulgt af et fald med 4 procentpoint til 2016 (73). Tilsvarende ses et fald i antallet af forløb, der blev gennemført med anvendelse af flere dage end anbefalet, fra 2013 (260) til 2015 (144) efterfulgt af 177 forløb i 2016. Andelen af forløb, der anvendte mere end 8 dage, faldt vedvarende over perioden, mens forløb med yderligere anvendelse af 4-7 dage steg lidt over perioden.

Derudover faldt den gennemsnitlige forløbstid ud over de anbefalede forløbstider til en tredjedel over perioden fra 32,3 dage i 2013 til 11,1 dage i 2016. Forløbsperioden for median forløbet faldt desuden med 2 dage fra 2013 til 6 dage i øvrige år. Antallet af dage for øvre kvartil forløbet faldt ligeledes med 3 dage til 13 dage i 2015 og 2016.

Pakkeforløb for modernærkekræft i hud

Forløbstiden for pakkeforløb for modernærkekræft i hud var generelt kortere i 2016 i forhold til i 2014.

Antallet af pakkeforløb steg fra 2.218 i 2013 til 2.662 i 2016. Andelen af forløb, der blev gennemført inden for anbefalede forløbstider, var på nogenlunde samme niveau alle år med 96-97 procent. I 2013-2015 blev der anvendt flere dage ved flere dage end anbefalet ved cirka 80 forløb mod for 120 forløb i 2016. Disse forløb var nogenlunde jævnt fordelt i definerede grupper med yderligere anvendelse af 1-3 dage, 4-7 dage, 8-15 dage og 16 + dage, hvilket svarer til en andel på omkring en procent i hver gruppe.

Den gennemsnitlige forløbstid ud over de anbefalede forløbstider blev mere end halveret fra 2013 (49,6 dage) til 2016 (17,1 dage) med højeste gennemsnit på 56,9 dage i 2014. Forløbsperioden for median forløbet faldt desuden med 3 dage over perioden til 7 dage i 2016. Perioden for øvre kvartil forløbet var desuden lavere i 2016 (14 dage) sammenlignet med 2013 (16 dage).

Pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Forløbstiden for pakkeforløb for lymfeknudekræft og lymfatisk leukæmi var generelt på niveau med eller kortere i 2016 i forhold til i 2013.

I 2013 og 2016 var antallet af pakkeforløb cirka 910. Det laveste antal forløb ses i 2015 med 857 forløb. Andel forløb, der blev gennemført inden for anbefalede forløbstider, steg 4 procentpoint fra 2013 til 92 procent i 2015, hvor andel forløb var 87 procent i 2016. 110 forløb anvendte yderligere dage i 2013 mod 115 i 2016. Det laveste antal forløb ses i 2015 med 70 forløb. I tre ud af fire år ses flest af disse forløb med yderligere anvendelse af 16+ dage undtaget i 2015, hvor det højeste antal forløb anvendte yderligere 1-3 dage. Andelen af disse forløb var tilsvarende højest i gruppen 16+ dage i 2013 (4,4 procent) og lavest i 2015 med 2,3 procent.

Andelen for løb med yderligere anvendelse af 1-3 dage var derimod højest i 2015 med 2,9 procent.

Den gennemsnitlige forløbstid ud over de anbefalede forløbstider ses mere end halveret fra 2013 (51,2 dage) til 2016 (21,5 dage) med det laveste gennemsnit på 19,3 dage i 2015. Perioden for øvre kvartil forløbet faldt fra 22 dage i 2013 til 19 dage i 2016, hvor der blev anvendt 17 dage i de mellemliggende år.

Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen

Forløbstiden for pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen var generelt på niveau med eller lidt kortere i 2016 i forhold til i 2013.

Antallet af pakkeforløb faldt vedvarende fra 445 i 2013 til 375 i 2016. Andel forløb, der blev gennemført inden for anbefalede forløbstider, faldt desuden 5 procentpoint fra 2013 til 73 procent i 2015, efterfulgt af en stigning til 76 procent i 2016. Tilsvarende ses, at antallet af disse forløb steg fra 2013 (100) til 115 i 2015 efterfulgt af 90 forløb i 2016. Alle fire år var disse forløb fordelt med flest forløb med yderligere anvendelse af over 16 dage, hvilket svarede til en andel forløb, der steg 2,7 procentpoint til og med 2015 (11,7 procent) med efterfølgende fald til 8,0 procent af forløbene i 2016.

Derudover blev den gennemsnitlige forløbstid ud over de anbefalede forløbstider halveret fra 2013 (43,6 dage) til 2016 (19,4 dage) med et gennemsnit på cirka 29 dage i de mellemliggende år. Forløbsperioden for median forløbet faldt med 3 dage fra 2014 til 11 dage i 2016. Perioden for øvre kvartil forløbet steg fra 23 dage i 2013 til 2015 (31 dage) efterfulgt af et fald til 19 dage i 2016.

Pakkeforløb for kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken

Forløbstiden for pakkeforløb for kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken var generelt kortere i 2016 i forhold til i 2013.

Antallet af pakkeforløb var over perioden nogenlunde på samme niveau med 522 forløb i 2013 til 532 forløb i 2016. Andel forløb, der blev gennemført inden for anbefalede forløbstider, steg fra 2013 (78 procent) til 2015 (84 procent) efterfulgt af et fald til 80 procent i 2016. Tilsvarende ses, at antallet af forløb, der anvendte yderligere dage i forløb, var på nogenlunde samme niveau i 2013 og 2016 på cirka 110 forløb, med færre forløb i mellemliggende år. Den største gruppe af forløb anvendte mere end 16 dage i 2013-2015, hvorimod det højeste antal forløb ses i gruppen 4-7 dage i 2016.

Derudover faldt den gennemsnitlige forløbstid ud over de anbefalede forløbstider fra 2013-2014 med cirka 27 dage til 17,6 dage i 2016. Forløbsperioden for median forløbet var 9-11 dage over perioden og perioden for øvre kvartil forløbet faldt fra 24 dage i 2013 til 16 dage i 2016.

4. Pakkeforløb for brystkræft

Andelen af forløb, der blev gennemført inden for den anbefalede forløbstid, steg fra 69 procent i 2013 til 83 procent i 2015 med efterfølgende 79 procent i 2016 med regionale forskelle, se *tabel 1*.

For den forløbstid, der lå ud over de anbefalede forløbstider, ses, at den gennemsnitlige forløbstid faldt med 19,6 dage fra 2014 til 2016, median forløbstid er på samme niveau og forløbstiden for 75 kvartil forløbet faldt med 3 dage.

Der skal være opmærksomhed på, at Region Hovedstaden alle fire år har gennemført flest pakkeforløb for brystkræft efterfulgt af regionerne Syddanmark og Midtjylland, se *bilag 3*.

Ligeledes skal der være opmærksomhed på, at implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på tallene i 2016.

Tabel 1 Andel forløb OF4* inden for anbefalede forløbstider** for brystkræft, fordelt efter sygehusregion, procent, 2013-2016.

	2013	2014	2015	2016
Nordjylland	81	74	70	75
Midtjylland	87	85	84	87
Syddanmark	85	91	89	88
Hovedstaden	49	72	79	67
Sjælland	62	85	89	74
Hele landet	69	81	83	79

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 27 dage.


I 2013 ses 3.829 pakkeforløb for brystkræft, i 2014-2015 ses omkring 4.000 forløb med et efterfølgende mindre antal i 2016 på 3.527 forløb, se *figur 1*.

Antallet af forløb, hvor der blev anvendt mere end den anbefalede forløbstid faldt fra sammenlagt 1.177 forløb i 2013 til omkring 758 i 2016 med mellemliggende udsving, se *bilag 3*.


I 2013 ses flest forløb i grupperne med yderligere anvendelse af 8-15 dage samt 16+ dage ud over den anbefalede forløbstid, hvor der i efterfølgende år ses flest forløb i gruppen med anvendelse af 1-3 dage ud over den anbefalede forløbstid, se *figur 1*.

Andelen af forløb med anvendelse af 1-3 dage mere end den anbefalede forløbstid ses nogenlunde på samme niveau over perioden, mens andelen af forløb med mere end 3 dage ud over anbefalede forløbstid var lavere i 2016 end i 2013, dog med mellemliggende lavere andele end i 2016, se *figur 2*.

Figur 1 Antal forløb OF4* brystkræft uanset forløbstid, antal forløb med anvendelse af flere dage i forløb end anbefalet**, fordelt efter antal dage anvendt ud over anbefalede forløbstid, hele landet, 2013-2016.



Figur 2 Andel forløb OF4* brystkræft med anvendelse af flere dage end anbefalet i forløb**, fordelt efter antal dage anvendt ud over anbefalede forløbstid, procent, hele landet, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

**Anbefalede forløbstid 'samlet tid til behandling OF4' angivet for kirurgisk behandling med 27 dage.


Der ses regionale forskelle, hvor der i Region Hovedstaden alle fire år havde en højere andel forløb med anvendelse af yderligere 1-3 dage i forløb i forhold til landstallet, mens regionerne Midtjylland og Syddanmark viser en lavere andel forløb. Samme billede ses for grupperne 4-7 dage og 8-15 dage, hvorimod der for gruppen 16+ dage findes, at regionerne Syddanmark og Sjælland havde en lavere andel forløb end landstallet alle år, se bilag 3.

Samtidig ses et fald i det gennemsnitlige antal dage for den tid af forløbet, der var ud over den anbefalede forløbstid, fra 39,3 dage i 2013 til 19,7 dage i 2016. Hvorimod denne forløbsperiode for median forløbet var 9 dage i 2013 mod 7 dage i 2016, se figur 3 og 4.


Faldet i gennemsnitlig forløbsperiode kan blandt andet være begrundet i et kraftig fald i antallet af dage i Region Midtjylland, der som den eneste region vedvarende ligger over landstallet. Det gennemsnitlige antal dage i denne region var 171,6 dage i 2013 mod 56,6 dage i 2016, se figur 3 og 4.

Desuden bemærkes det, at fire ud af fem regioner anvender færre dage i gennemsnit og for median forløbet for denne del af forløbsperioden i 2016 end i 2013, undtaget Region Midtjylland, der anvender flere, se figur 3 og 4.

Figur 3 Gennemsnit i dage af anvendt tid ud over anbefalede forløbstid OF4* brystkræft, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Figur 4 Antal dage for median forløbet for den anvendte tid ud over anbefalede forløbstid OF4* brystkræft, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 27 dage.

Overstående bør ses i sammenhæng med det maksimalt antal anvendte dage i forløb ud over den anbefalede forløbstid samt forløbsperioden for 25 henholdsvis 75 kvartil forløbet for denne del af den samlede forløbstid.

I 2013 var det maksimale antal anvendte dage i forløb ud over den anbefalede forløbstid 1.483 mod 672 dage i 2016. I 2013 ses tre regioner, hvor der maksimalt blev anvendt tilsvarende antal dage, hvor der i 2016 generelt var anvendt et færre antal dage ud over den anbefalede forløbstid i alle regioner, se bilag 3.

Desuden ses, at antal anvendte dage ud over den anbefalede forløbstid for 25 kvartil forløbet var 3 dage i 2013 mod 1 dag i 2014-2016. Ligeledes var antal anvendte dage for 75 kvartil forløbet 16 dage i 2013 mod 13 dage i 2016. Dette er udtryk for, at af de forløb der anvendte mere end den anbefalede forløbstid, blev der anvendt færre dage for 25 procent henholdsvis 75 procent af disse forløb i 2016 i forhold til i 2013, se bilag 1 og 3.

5. Pakkeforløb for lungekræft

Andelen af forløb, der blev gennemført inden for den anbefalede forløbstid på tværs af behandlingsformer var stigende over perioden fra 71 procent i 2013 til 75 procent i 2016 med regionale forskelle, se *tabel 2*.

For den forløbstid, der lå ud over de anbefalede forløbstider, ses, at den gennemsnitlige forløbstid faldt med 13,9 dage fra 2014 til 2016. I samme periode var forløbstiden for median forløbet på samme niveau og forløbstiden for 75 kvartil forløbet faldt med 3 dage.

Der skal være opmærksomhed på, at Region Syddanmark alle fire år har gennemført flest pakkeforløb for lungekræft, efterfulgt af regionerne Hovedstaden og Midtjylland, se *bilag 4*.

Desuden skal der være opmærksomhed på, at implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på tallene i 2016.

Tabel 2 Andel forløb OF4* inden for anbefalede forløbstider** for lungekræft, fordelt efter sygehusregion, procent, 2013-2016.

	2013	2014	2015	2016
Nordjylland	63	55	76	73
Midtjylland	74	75	75	77
Syddanmark	72	74	75	78
Hovedstaden	68	67	69	63
Sjælland	75	77	80	83
Hele landet	71	70	74	75

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 44 dage, kemoterapi med 41 dage og strålebehandling med 45 dage.


I 2013 ses 3.109 pakkeforløb for lungekræft stigende til 3.359 forløb i 2016 med et mellemliggende lidt højere niveau, se *figur 5*.

Antallet af forløb, der blev gennemført med anvendelse af flere dage end anbefalet, faldt fra 913 i 2013 til 836 forløb i 2016 med et noget højere antal i 2014, se *bilag 4*.


I alle fire år ses flest forløb med yderligere anvendelse af 8-15 dage samt 16+ dage ud over den anbefalede forløbstid. Desuden ses et faldende antal forløb i perioden i gruppen 1-3 dage ud over anbefalede forløbstid, se *figur 5*.

Andelen af forløb med anvendelse af 8-15 dage samt 16+ dage mere end anbefalede forløbstid ses vedvarende at være højere end for de to øvrige grupper. Andel forløb med 16+ dage ses faldende fra og med 2014, se *figur 6*.

Figur 5 Antal forløb OF4* lungekræft uanset forløbstid, antal forløb OF4 med anvendelse af flere dage forløb end anbefalet**, fordelt efter antal dage anvendt ud over anbefalede forløbstid, hele landet, 2013-2016.



Figur 6 Andel forløb OF4* lungekræft med anvendelse af flere dage end anbefalet i forløb**, fordelt efter overskridelsestid i antal dage, procent, hele landet, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 44 dage, kemoterapi med 41 dage og strålebehandling med 45 dage.


Der ses regionale forskelle i andel forløb, der anvender mere end anbefalede forløbstid. For grupperne 1-3 dage og 4-7 dage ses, at regionerne Nordjylland og Hovedstaden vedvarende havde højere andel forløb end landstallet, mens der for de to sidste grupper er et mere vekslende billede, se bilag 4.

Samtidig ses et fald i gennemsnitlig antal dage for tiden ud over den anbefalede forløbstid fra 43,8 dage i 2013 til 32,6 dage i 2016. Hvorimod antallet af dage anvendt for median forløbet var 11-12 dage over hele perioden, se figur 7 og 8.


I alle regioner faldt gennemsnittet i anvendte dage ud over de anbefalede forløbstider. De største fald ses i regionerne Sjælland og Midtjylland. I Region Sjælland faldt gennemsnittet fra 67,4 dage i 2013 til 25,3 dage i 2016 med en mellemliggende værdi på cirka 115 dage i 2014. Hvor gennemsnittet i Region Midtjylland faldt fra 89,9 dage i 2013 til 66,3 dage i 2016 med omkring 80 dage i de mellemliggende år.

Antal dage for median forløbet for tiden ud over de anbefalede forløbstider var over eller på niveau med landstallet i tre ud af de fem regioner i de fire år. Samtidigt ses, at antal dage for median forløbet var højere i 2016 end i 2013 i tre ud af de fem regioner med en forøgelse af forløbstid med 2-3 dage. Mens antallet af dage i denne del af forløbene var lavere i 2016 end i 2013 i Region Sjælland, se figur 7 og 8.

Figur 7 Gennemsnit i dage af anvendt tid ud over anbefalede forløbstid OF4* lungekræft, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Figur 8 Antal dage for median forløbet for den anvendte tid ud over anbefalede forløbstid OF4* lungekræft, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 44 dage, kemoterapi med 41 dage og strålebehandling med 45 dage.

Overstående bør ses i sammenhæng med det maksimalt antal anvendte dage i forløb ud over den anbefalede forløbstid samt forløbsperioden for 25 henholdsvis 75 kvartil forløbet for denne del af den samlede forløbstid.

I 2013 var det maksimale antal anvendte dage 1.521 mod 584 dage i 2016. I 2013 ses en forskel mellem 521 dage i Region Syddanmark og 1.521 dage i Region Midtjylland, der maksimalt blev anvendt, hvor den regionale forskel var mindre og på et lavere niveau i 2016 med 273 dage i Region Nordjylland og 584 dage i Region Midtjylland, se bilag 4.

Desuden ses, at der blev anvendt 4 dage ud over den anbefalede forløbstid for 25 kvartil forløbet alle fire år. Ligeledes var antal anvendte dage for 75 kvartil forløbet 24 dage i 2013 og i 2016, hvorimod der blev anvendt et lidt højere antal dage i de mellemliggende år. Dette er udtryk for, at de for forløb, der anvendte mere end den anbefalede forløbstid, blev der nogenlunde anvendt samme antal dage for 25 procent henholdsvis 75 procent af disse forløb i 2013 og i 2016, se bilag 1 og 4.

6. Pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm

Andelen af forløb, der blev gennemført inden for den anbefalede forløbstid på tværs af behandlingsformer, var 81 procent i 2013 mod 82 procent i 2016 med regionale forskelle, *se tabel 3*.

For den forløbstid, der lå ud over de anbefalede forløbstider, ses, at den gennemsnitlige forløbstid faldt med 30,3 dage fra 2013 til 2016, forløbstiden for median forløbet var på samme niveau og forløbstid for 75 kvartil forløbet faldt med 5 dage over perioden.

Der skal være opmærksomhed på, at regionerne Hovedstaden og Syddanmark alle fire år har gennemført flest pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm, *se bilag 5*.

Ligeledes skal der være opmærksomhed på, at implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på tallene i 2016.

Tabel 3 Andel forløb OF4* inden for anbefalede forløbstider** for kræft i tyk- og endetarm, fordelt efter sygehusregion, procent, 2013-2016.

	2013	2014	2015	2016
Nordjylland	85	76	81	77
Midtjylland	84	85	85	86
Syddanmark	87	84	84	86
Hovedstaden	77	74	77	83
Sjælland	76	65	76	73
Hele landet	81	77	81	82

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 37 dage, kemoterapi med 37 dage og strålebehandling med 41 dage.


I 2013 ses 3.302 pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm stigende til 3.827 forløb i 2016 med et mellemliggende lidt højere niveau, *se figur 9*.

Antallet af forløb, der blev gennemført med anvendelse af flere dage end anbefalet, steg fra 612 i 2013 til 695 forløb i 2016 med et noget højere antal i 2014 og 2015, dog ses et samlet fald fra 2014 til 2016, *se bilag 5*.


I alle fire år ses flest forløb med yderligere anvendelse af 16+ dage ud over den anbefalede forløbstid. I 2013 og 2014 blev der anvendt 4-7 dage ud over de anbefalede forløbstider for næst-flest forløb, mens dette var gældende for gruppen 8-15 dage i 2015 og 2016. Derudover ses, at antallet af forløb i gruppen 1-3 dage ud over anbefalede forløbstid steg over perioden, *se figur 9*.

Andelen af forløb med anvendelse af 16+ dage mere end anbefalede forløbstid ses vedvarende at være højere end de øvrige grupper. Andel forløb med 16+ dage faldt fra og med 2014, se figur 10.

Figur 9 Antal forløb OF4* kræft i tyk- og endetarm uanset forløbstid, antal forløb OF4 med anvendelse af flere dage forløb end anbefalet**, fordelt efter antal dage anvendt ud over anbefalede forløbstid, 2013-2016.



Figur 10 Andel forløb OF4* kræft i tyk- og endetarm med anvendelse af flere dage end anbefalet i forløb**, fordelt efter overskridelsestid i antal dage, procent, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 37 dage, kemoterapi med 37 dage og strålebehandling med 41 dage.


Der ses regionale forskelle i andel forløb, der anvendte mere end de anbefalede forløbstider. For grupperne 1-3 dage, 4-7 dage og 16+ dage ses, at Region Hovedstaden vedvarende havde en højere andel eller var på niveau med landstallet, mens der for den sidste gruppe (8-15 dage) ses den højeste andel forløb i 2013, hvorimod andelen af disse forløb var lavere end landstallet i resten af perioden, se bilag 5.

Samtidig ses et fald i det gennemsnitlige antal dage for tiden anvendt i forløb ud over de anbefalede forløbstider fra 52,6 dage i 2013 til 22,3 dage i 2016. Antallet af dage anvendt for median forløbet var 11-12 dage over hele perioden, se figur 11 og 12.


I fire ud af de fem regioner faldt gennemsnittet i antal anvendte dage ud over de anbefalede forløbstider fra 2013 til 2016, hvorimod gennemsnittet var på samme niveau i Region Nordjylland i 2013 og 2016 med et mellemliggende gennemsnit på 45,6 dage i 2015. De største fald ses i regionerne Midtjylland og Hovedstaden. I Region Midtjylland faldt gennemsnittet fra 164,2 dage i 2013 til 36,3 dage i 2016. Hvor gennemsnittet i Region Hovedstaden faldt fra 40,1 dage i 2013 til 19,7 dage i 2016, se figur 11.

I Region Midtjylland var antal dage for median forløbet for tiden ud over de anbefalede forløbstider over eller på niveau med landstallet i alle fire år og derudover ses et samlet fald fra 22 dage i 2013 til 12 dage i 2016. Ligeledes var antal dage for median forløbet højere i 2016 end i 2013 i Region Sjælland, se figur 12.

Figur 11 Gennemsnit i dage af anvendt tid ud over anbefalede forløbstid OF4* tyk- og endetarmskræft, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Figur 12 Antal dage for median forløbet for den anvendte tid ud over anbefalede forløbstid OF4* tyk- og endetarmskræft, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 37 dage, kemoterapi med 37 dage og strålebehandling med 41 dage.

Overstående bør ses i sammenhæng med det maksimalt antal anvendte dage i forløb ud over den anbefalede forløbstid samt forløbsperioden for 25 henholdsvis 75 kvartil forløbet for denne del af den samlede forløbstid.

I 2013 var det maksimale antal anvendte dage i forløb på 1.339 dage mod 479 dage i 2016. Det maksimale antal anvendte dage faldt fra og med 2014, hvor antallet af dage var 1.365. I 2013 ses, at regionerne Nordjylland og Syddanmark maksimalt anvendte cirka 450 dage, hvor regionerne Hovedstaden og Sjælland maksimalt havde anvendt lidt over 1.000 dage, mens Region Midtjylland maksimalt anvendte 1.339 dage. De regionale forskelle var mindre og på et lavere niveau i 2016 med 179 dage i Region Syddanmark, som det laveste, og 479 dage i Region Midtjylland, som det højeste, se bilag 5.

Desuden ses, at antallet af anvendte dage i forløb ud over den anbefalede forløbstid for 25 kvartil forløbet var 4 dage alle fire år. Ligeledes ses, at antallet af anvendte dage for 75 kvartil forløbet var 26 dage i 2013 faldende til 21 dage i 2016. Dette er udtryk for, at af de forløb der anvendte mere end den anbefalede forløbstid, blev der maksimalt anvendt samme antal dage for 25 procent af disse forløb og maksimalt færre dage for 75 procent af disse forløb i 2016 i forhold til i 2013, se bilag 1 og 5.

7. Pakkeforløb for hoved- og halskræft

Andelen af forløb, der blev gennemført inden for den anbefalede forløbstid på tværs af behandlingsformer, var 55 procent i 2013 mod 80 procent i 2016 med regionale forskelle, se *tabel 4*.

For den forløbstid, der lå ud over de anbefalede forløbstider, ses, at den gennemsnitlige forløbstid faldt med 13,0 dage fra 2013 til 2016, median forløbstid faldt med 4 dage og forløbstid for 75 kvartil forløbet faldt med 7 dage.

Der skal være opmærksomhed på, at Region Hovedstaden alle fire år har gennemført flest pakkeforløb for hoved- og halskræft, se *bilag 6*.

Ligeledes skal der være opmærksomhed på, at implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på tallene i 2016.

Tabel 4 Andel forløb OF4* inden for anbefalede forløbstider** for hoved- og halskræft, fordelt efter sygehusregion, procent, 2013-2016.

	2013	2014	2015	2016
Nordjylland	70	75	87	93
Midtjylland	59	70	72	71
Syddanmark	81	87	88	85
Hovedstaden	42	73	79	84
Sjælland	-	-	47	50
Hele landet	55	77	79	80

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 28 dage, kemoterapi med 32 dage og strålebehandling med 32 dage.

Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10.

I 2013 ses 1.655 pakkeforløb for hoved- og halskræft stigende til 1.766 forløb i 2016 med et mellemliggende lidt højere niveau i 2015, se *figur 13*.


Antallet af forløb, der blev gennemført med anvendelse af flere dage end anbefalet, faldt fra 738 i 2013 til 345 forløb i 2016 med et lidt højere antal i 2015 (377 forløb), se *bilag 6*.

I 2013 og 2016 ses flest forløb med yderligere anvendelse af 16+ dage ud over den anbefalede forløbstid med henholdsvis 305 forløb og 95 forløb. Hvorimod der ses flest forløb i gruppen med yderligere anvendelse af 1-3 dage i 2014 og 2015, hvor antallet af forløb henholdsvis var 119 og 129, se *figur 13*.


Andelen af forløb med anvendelse af 16+ dage mere end anbefalede forløbstid var højest i 2013 med 18,4 procent mod 5,4 procent i 2016, hvor der var andel forløb på henholdsvis 5,6

procent i 2014 og 5,2 procent i 2015. Desuden ses en faldende andel forløb, hvor der blev anvendt yderligere 1-3 dage fra 2014 med 7,8 procent til 5,3 procent i 2016, se figur 14.

Figur 13 Antal forløb OF4* hoved- og halskræft uanset forløbstid, antal forløb OF4 med anvendelse af flere dage forløb end anbefalet**, fordelt efter antal dage anvendt ud over anbefalede forløbstid, 2013-2016.



Figur 14 Andel forløb OF4* hoved- og halskræft med anvendelse af flere dage end anbefalet i forløb**, fordelt efter overskridelsestid i antal dage, procent, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 28 dage, kemoterapi med 32 dage og strålebehandling med 32 dage.


Der ses regionale forskelle i andel forløb, der anvendte mere end anbefalede forløbstid. For grupperne 1-3 dage og 8-15 dage ses, at der for Region Midtjylland var vedvarende højere andel forløb eller andel på niveau med landstallet. For forløb med anvendelse af yderligere 4-7 dage ses, at andel forløb i Region Hovedstaden faldt fra 12 procent i 2013 til 3,6 procent i 2016, hvilket for 2016 var under landstallet. I samme region ses vedvarende højere andele af forløb, hvor der blev anvendt yderligere 16+ dage, sammenlignet med landstallet, se bilag 6.

Samtidig ses et fald i gennemsnitlig antal dage i forløb anvendt ud over den anbefalede forløbstid fra 39,1 dage i 2013 til 26,1 dage i 2016, hvor der i gennemsnit blev anvendt færre dage i 2014 og 2015. Ligeledes faldt antallet af dage for median forløbet vedvarende fra 12 dage i 2013 til 7-8 dage i resten af perioden, se figur 15 og 16.


I fire ud af de fem regioner faldt gennemsnittet i anvendte dage i forløb ud over de anbefalede forløbstider i 2013-2016. I Region Hovedstaden blev der derimod i gennemsnit anvendt flere dage ud over anbefalede forløbstid i 2016 i forhold til i 2013, hvor gennemsnittet steg fra 28,2 dage i 2013 til 45,2 dage i 2016. Desuden ses et fald med omkring 50 dage i regionerne Midtjylland og Syddanmark. I Region Midtjylland faldt gennemsnittet fra 70,7 dage i 2013 til 20,9 dage i 2016. Hvor gennemsnittet i Region Syddanmark faldt fra 55,1 dage i 2013 til 6,6 dage i 2016, se figur 15.

I Region Hovedstaden var antal dage for median forløbet for tiden ud over de anbefalede forløbstider over eller på niveau med landstallet alle fire år, se figur 16.

Figur 15 Gennemsnit i dage af anvendt tid ud over anbefalede forløbstid OF4* hoved- og halskræft, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Figur 16 Antal dage for median forløbet for den anvendte tid ud over anbefalede forløbstid OF4* hoved- og halskræft, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 28 dage, kemoterapi med 32 dage og strålebehandling med 32 dage.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ingen forløb angives med '-'.

Overstående bør ses i sammenhæng med det maksimalt antal anvendte dage i forløb ud over den anbefalede forløbstid samt forløbsperioden for 25 henholdsvis 75 kvartil forløbet for denne del af den samlede forløbstid.

I 2013 var det maksimale antal anvendte dage 1.426 mod 538 dage i 2016. Det maksimale antal anvendte dage ud over de anbefalede forløbstider faldt vedvarende over perioden. Regionerne Midtjylland og Hovedstaden, der i 2013 maksimalt anvendte henholdsvis 1.243 dage og 1.360 dage i forløb i 2013, anvendte maksimalt langt færre dage i forløb i 2016, se bilag 6.

Desuden var antallet af anvendte antal dage ud over den anbefalede forløbstid for 25 kvartil forløbet 5 dage i 2013 mod 2 dage i 2016. Desuden var antallet af anvendte dage for 75 kvartil forløbet 23 dage i 2013 mod 14 dage i 2014 med efterfølgende stigning til 16 dage i 2016. Dette er udtryk for, at af de forløb der anvendte mere end den anbefalede forløbstid, blev der maksimalt anvendt færre dage for 25 procent henholdsvis 75 procent af disse forløb i 2016 i forhold til i 2013, se bilag 1 og 6.

8. Pakkeforløb for blærekræft

Andelen af forløb, der blev gennemført inden for den anbefalede forløbstid på tværs af behandlingsformer, var 50 procent i 2013 som den højeste andel i perioden mod 40 procent i 2014 med efterfølgende stigning til 46 procent i 2016 med regionale forskelle, *se tabel 5*.

For den forløbstid, der lå ud over de anbefalede forløbstider, ses, at den gennemsnitlige forløbstid faldt med 20,7 dage fra 2013 til 2016, median forløbstid faldt med 7 dage og forløbstid for 75 kvartil forløbet faldt med 15 dage.

Der skal være opmærksomhed på, at Region Hovedstaden de første tre år gennemførte flest pakkeforløb for blærekræft. I 2016 blev der gennemført nogenlunde lige mange pakkeforløb i regionerne Hovedstaden og Midtjylland. For Region Sjælland ses under 10 pakkeforløb hvert af årene, *se bilag 7*.

Ligeledes skal der være opmærksomhed på, at implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på tallene i 2016.

Tabel 5 Andel forløb OF₄* inden for anbefalede forløbstider** for blærekræft, fordelt efter sygehusregion, procent, 2013-2016.

	2013	2014	2015	2016
Nordjylland	43	50	38	36
Midtjylland	29	32	29	44
Syddanmark	24	34	42	49
Hovedstaden	64	50	51	56
Sjælland	-	-	-	-
Hele landet	50	40	41	46

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling'.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 45 dage, kemoterapi med 48 dage og strålebehandling med 52 dage.

Andel forløb maskeres med '-' ved antal forløb 1-10.


I 2013 blev 773 pakkeforløb for blærekræft gennemført med efterfølgende fald til 528 forløb i 2016, *se figur 17*.

Antallet af forløb, der blev gennemført med anvendelse af flere dage end anbefalet, faldt fra 385 i 2013 til 284 forløb i 2016, *se bilag 7*.


I 2013-2016 var der hvert år flest forløb med yderligere anvendelse af 16+ dage ud over den anbefalede forløbstid med 255 forløb i 2013 faldende til 161 forløb i 2016. Ligeledes var det næsthøjeste antal forløb i gruppen med anvendelse af yderligere 8-15 dage, *se figur 17*.

Andel forløb med anvendelse af 16+ dage mere end anbefalede forløbstid var højest i 2014 med 39,1 procent. Andelsprocenten faldt vedvarende til 30,5 procent i 2016. For øvrige grupper ses en højere andel forløb i 2016 i forhold til andel forløb i 2013, se figur 18.

Figur 17 Antal forløb OF4* blærekræft uanset forløbstid, antal forløb OF4 med anvendelse af flere dage forløb end anbefalet**, fordelt efter antal dage anvendt ud over anbefalede forløbstid, 2013-2016.



Figur 18 Andel forløb OF4* blærekræft med anvendelse af flere dage end anbefalet i forløb**, fordelt efter overskridelsestid i antal dage, procent, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 45 dage, kemoterapi med 48 dage og strålebehandling med 52 dage

Der ses regionale forskelle i andel forløb, der anvender mere end den anbefalede forløbstid. For grupperne 1-3 dage og 4-7 dage var antallet af forløb under eller lig med 10 i flere regioner over perioden, hvorfor der ikke kommenteres yderligere på disse. Andel forløb med yderligere anvendelse af 8-15 dage var højest i regionerne Midtjylland og Syddanmark i hele perioden, se bilag 7.


I Region Syddanmark faldt andelen af forløb med brug af yderligere 16+ dage vedvarende fra 47,7 procent i 2013 til 31,5 procent i 2016. For Region Midtjylland ses et vedvarende fald fra 50,3 procent i 2014 til 30,8 procent i 2016, se bilag 7.

Ligeledes ses et samtidig fald i gennemsnitlig antal dage anvendt ud over den anbefalede forløbstid fra 55,4 dage i 2013 til 34,7 dage i 2016. Antallet af dage anvendt for median forløbet faldt ligeledes fra 24 dage i 2013 til 17 i 2016, se figur 19 og 20.


I to ud af de fem regioner faldt gennemsnittet i antal anvendte dage ud over de anbefalede forløbstider fra 2013 til 2016. Der største fald i gennemsnittet ses i Region Nordjylland fra 83,5 dage i 2013 til 28,4 dage i 2016, se figur 19.

Der ses regionale forskelle i antal dage for median forløbet for tiden ud over de anbefalede forløbstider, se figur 20.

Figur 19 Gennemsnit i dage af anvendt tid ud over anbefalede forløbstid OF4* blærekræft, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Figur 20 Antal dage for median forløbet for den anvendte tid ud over anbefalede forløbstid OF4* blærekræft, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 45 dage, kemoterapi med 48 dage og strålebehandling med 52 dage

Overstående bør ses i sammenhæng med det maksimalt antal anvendte dage i forløb ud over den anbefalede forløbstid samt forløbsperioden for 25 henholdsvis 75 kvartil forløbet for denne del af den samlede forløbstid.

I 2013 var det maksimale antal anvendte dage i forløb 1.049 mod 411 dage i 2016. Det maksimale antal anvendte dage ud over de anbefalede forløbstider faldt vedvarende over perioden. Desuden anvendte alle regioner maksimalt færre dage i 2016 i forhold til i 2013, dog med nogen udsving i mellemliggende år, se bilag 7.

Desuden ses, at antallet af anvendte dage ud over den anbefalede forløbstid for 25 kvartil forløbet faldt fra 11 dage i 2013 til 7 dage i 2016. Ligeledes faldt antal anvendte dage for 75 kvartil forløbet vedvarende fra 49 dage i 2013 mod 34 dage i 2016. Dette er udtryk for, at af de forløb der anvendte mere end den anbefalede forløbstid, blev der maksimalt anvendt færre dage for 25 procent henholdsvis 75 procent af disse forløb i 2016 i forhold til i 2013, se bilag 1 og 7.

9. Pakkeforløb for nyrekræft

59 procent af pakkeforløb for nyrekræft blev gennemført inden for den anbefalede forløbstid på tværs af behandlingsformer i 2013 mod 75 procent i 2016. Der ses en vedvarende stigning i perioden, se *tabel 6*.

For den forløbstid, der lå ud over de anbefalede forløbstider, ses, at den gennemsnitlige forløbstid faldt med 40,3 dage fra 2013 til 2016, median forløbstid faldt med 11 dage og forløbstid for 75 kvartil forløbet faldt med 27 dage.

Der skal være opmærksomhed på, at Region Hovedstaden gennemførte flest pakkeforløb for nyrekræft i 2013. I resten af perioden gennemførte regionerne Midtjylland og Hovedstaden flest pakkeforløb, se *bilag 8*.

Ligeledes skal der være opmærksomhed på, at implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på tallene i 2016.

Tabel 6 Andel forløb OF4* inden for anbefalede forløbstider** for nyrekræft, fordelt efter sygehusregion, procent, 2013-2016.

	2013	2014	2015	2016
Nordjylland	54	43	44	66
Midtjylland	72	66	58	76
Syddanmark	65	74	69	64
Hovedstaden	51	62	74	90
Sjælland	-	79	-	-
Hele landet	59	64	67	75

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 45 dage, kemoterapi med 48 dage og strålebehandling med 52 dage.

Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10.

I 2013 ses 636 pakkeforløb for nyrekræft stigende til 796 i 2015 med efterfølgende fald til 744 forløb i 2016, se *figur 21*.


Der ses en mindre stigning i antallet af forløb, der blev gennemført med anvendelse af flere dage end anbefalet, fra 2013 til 2014 med et efterfølgende fald til 2016. Antal forløb var i 2014 275 mod 183 forløb i 2016, se *bilag 8*.

Hvert af årene 2013-2016 ses flest forløb med yderligere anvendelse af 16+ dage ud over den anbefalede forløbstid. I 2013 ses 173 forløb faldende til 103 forløb i 2016. Desuden var det næsthøjeste antal forløb, hvor der var anvendt yderligere 8-15 dage, se *figur 21*.


Andel forløb med anvendelse af 16+ dage mere end anbefalede forløbstid faldt vedvarende fra 27,2 procent i 2013 til 13,8 procent i 2016. Andel forløb for grupperne 4-7 dage og 8-15 dage

yderligere var lavere i 2016 sammenlignet med i 2013 og andel forløb med anvendelse af 1-3 dage yderligere var på omkring 3 procent alle fire år, se figur 22.

Figur 21 Antal forløb OF4* nyrekræft uanset forløbstid, antal forløb OF4 med anvendelse af flere dage forløb end anbefalet**, fordelt efter antal dage anvendt ud over anbefalede forløbstid, 2013-2016.



Figur 22 Andel forløb OF4* nyrekræft med anvendelse af flere dage end anbefalet i forløb**, fordelt efter overskridelsestid i antal dage, procent, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 45 dage og kemoterapi med 45 dage


Der ses regionale forskelle i andel forløb, der anvender mere end den anbefalede forløbstid. For grupperne 1-3 dage, 4-7 dage og 8-15 dage var antallet af forløb under eller lig med 10 i flere regioner over perioden, hvorfor der ikke kommenteres yderligere på disse. Andelen af forløb med yderligere anvendelse af 16+ dage var vedvarende højest i Region Nordjylland i hele perioden. Desuden faldt andelen af disse forløb i regionerne Nordjylland og Hovedstaden fra 2013 til 2016, se bilag 8.

Det gennemsnitlige antal dage, der blev anvendt ud over den anbefalede forløbstid, faldt vedvarende fra 79,2 dage i 2013 til 38,9 dage i 2016. Ligeledes faldt antallet af dage anvendt for median forløbet fra 29 dage i 2013 til 18 dage i 2016, se figur 23 og 24.


I to ud af de fem regioner faldt gennemsnittet i anvendte dage ud over de anbefalede forløbstider i 2013-2016. Region Nordjylland lå vedvarende over landstallet i perioden. Den regionale fordeling var mellem 97,5 dage til 58,0 dage i 2013, hvorimod den regionale variation i 2016 var mellem 55,5 dage til 25,8 dage, se figur 23.

Der ses regionale forskelle i antal anvendte dage for median forløbet ud over de anbefalede forløbstider, hvor variationen var større i 2013 end i 2016, se figur 24.

Figur 23 Gennemsnit i dage af anvendt tid ud over anbefalede forløbstid OF4* nyrekræft, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Figur 24 Antal dage for median forløbet for den anvendte tid ud over anbefalede forløbstid OF4* nyrekræft, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 45 dage og kemoterapi med 45 dage

Overstående bør ses i sammenhæng med det maksimale antal anvendte dage i forløb ud over den anbefalede forløbstid samt forløbsperioden for 25 henholdsvis 75 kvartil forløbet for denne del af den samlede forløbstid.

I 2013 var det maksimale antal anvendte dage 1.523 mod 598 dage i 2016. Det maksimale antal anvendte dage ud over de anbefalede forløbstider faldt vedvarende over perioden. Desuden ses, at fire ud af fem regioner maksimalt anvendte færre dage i forløb i 2016 i forhold til i 2013, undtaget Region Sjælland, se bilag 8.

Antallet af anvendte dage ud over den anbefalede forløbstid for 25 kvartil forløbet faldt fra 9 dage i 2013 til 7 dage i 2016. Ligeledes faldt antallet af anvendte dage for 75 kvartil forløbet fra 65 dage i 2013 mod 38 dage i 2016. Dette er udtryk for, at af de forløb der anvendte mere end den anbefalede forløbstid, blev der anvendt færre dage for 25 procent henholdsvis 75 procent af disse forløb i 2016 sammenlignet med i 2013, se bilag 1 og 8.

10. Pakkeforløb for prostatakræft

34 procent af pakkeforløb for prostatakræft blev gennemført inden for den anbefalede forløbstid på tværs af behandlingsformer i 2013 mod 58 procent i 2016. Der ses en vedvarende stigning i perioden, se *tabel 7*.

I vurderingen af stigningen i andel forløb gennemført inden for anbefalede forløbstider fra 2013 til 2014 skal der være opmærksomhed på, at der i 2014 blev indført en anden registreringspraksis for kirurgisk behandling, se *boks 3*.

Boks 3. Implementering af nervebesparende kirurgi per 1. januar 2014

I 2013 besluttede Sundhedsstyrelsen at implementere ny behandlingsform for pakkeforløb for prostatakræft med opdeling i kirurgisk behandling og nervebesparende kirurgi med ny registreringspraksis til følge fra og med 1. januar 2014. Dette kan have indflydelse på tallene, da pakkeforløb med nervebesparende kirurgi er blevet defineret med væsentlig længere forløbstid end for kirurgisk behandling (se bilag 1 og 2).

For den forløbstid, der lå ud over de anbefalede forløbstider, ses, at den gennemsnitlige forløbstid faldt med 21,3 dage fra 2013 til 2016, median forløbstid faldt med 12 dage og forløbstid for 75 kvartil forløbet faldt med 28 dage.

Region Hovedstaden gennemførte flest pakkeforløb for prostatakræft i perioden 2013-2016, hvor antallet af forløb faldt over perioden. Dernæst følger regionerne Midtjylland og Syddanmark. For Region Sjælland ses færre end 20 pakkeforløb alle fire år, se *bilag 9*.

Ligeledes skal der være opmærksomhed på, at implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på tallene i 2016.

Tabel 7 Andel forløb OF₄* inden for anbefalede forløbstider** for prostatakræft, fordelt efter sygehusregion, procent, 2013-2016.

	2013	2014	2015	2016
Nordjylland	18	19	28	30
Midtjylland	43	45	51	69
Syddanmark	39	45	43	43
Hovedstaden	31	57	71	64
Sjælland	-	-	-	-
Hele landet	34	48	54	58

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 50 dage, nervebesparende kirurgi 82 dage og strålebehandling med 55 dage


I 2013 ses 1.318 pakkeforløb for prostatakraft faldende til 1.097 forløb i 2016, *se figur 25*.

Der ses et fald i antallet af forløb, der blev gennemført med anvendelse af flere dage end anbefalet, fra 2013 til 2016. Antal forløb var i 2013 864 forløb mod 465 forløb i 2016, *se bilag 9*.


Hvert af årene 2013-2016 ses flest forløb med yderligere anvendelse af 16+ dage ud over den anbefalede forløbstid. I 2013 ses 635 forløb faldende til 295 forløb i 2016. Ligeledes ses næstflest forløb i gruppen med anvendelse af yderligere 8-15 dage, *se figur 25*.

Andelen af forløb med anvendelse af 16+ dage mere end anbefalede forløbstid faldt vedvarende fra 48,2 procent i 2013 til 26,9 procent i 2016. For øvrige grupper ses mindre variationer, *se figur 25*.

Figur 25 Antal forløb OF4* prostatakraft uanset forløbstid, antal forløb OF4 med anvendelse af flere dage forløb end anbefalet**, fordelt efter antal dage anvendt ud over anbefalede forløbstid, 2013-2016.



Figur 26 Andel forløb OF4* prostatakraft med anvendelse af flere dage end anbefalet i forløb**, fordelt efter overskridelsestid i antal dage, procent, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 50 dage, nervebesparende kirurgi 82 dage og strålebehandling med 55 dage

Regionerne Nordjylland og Sjælland havde mindre end 10 forløb med yderligere anvendelse af 1-3 dage, 4-7 dage og 8-15 dage, hvorfor de ikke medtages i nedenstående beskrivelse.


På tværs af de øvrige regioner ses forskelle i antal og andele forløb, hvor der blev anvendt mere end den anbefalede forløbstid. Antallet af forløb er på et væsentligt lavere niveau ved forløb, hvor der blev anvendt yderligere 1-3 dage, 4-7 dage og 8-15 dage sammenlignet med gruppen med anvendelse af yderligere 16+ dage. Generelt ses højere andele forløb for gruppen 8-15 dage i forhold til grupperne 1-3 dage og 4-7 dage alle fire år. Andelen af forløb med yderligere anvendelse af 16+ dage var vedvarende højest i Region Nordjylland i hele perioden, dog faldt andelen af forløb fra 2013 til 2016, se bilag 9.

Det gennemsnitlige antal dage, der blev anvendt ud over den anbefalede forløbstid, faldt vedvarende fra 88,9 dage i 2013 til 44,7 dage i 2016. Antallet af dage anvendt for median forløbet faldt ligeledes fra 37 dage i 2013 til 25 dage i 2016, se figur 27 og 28.


De gennemsnitlige antal anvendte dage ud over de anbefalede forløbstider i 2013-2016 faldt i alle regioner, dog i varierende grad. Regionerne Nordjylland og Midtjylland lå vedvarende over landstallet i perioden, mens Region Hovedstaden lå under landstallet alle fire år. Den regionale fordeling i 2013 var mellem 205,3 dage til 63,3 dage, hvorimod den regionale variation var mellem 56,1 dage til 26,3 dage i 2016, se figur 27.

Der ses regionale forskelle i antal dage for median forløbet ud over de anbefalede forløbstider, hvor variationen var mellem 63 dage og 31 dage i 2013 mod 40 dage og 15 dage i 2016, se figur 28.

Figur 27 Gennemsnit i dage af anvendt tid ud over anbefalede forløbstid OF4* prostatakræft, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Figur 28 Antal dage for median forløbet for den anvendte tid ud over anbefalede forløbstid OF4* prostatakræft, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 50 dage, nervebesparende kirurgi 82 dage og strålebehandling med 55 dage

Overstående bør ses i sammenhæng med det maksimalt antal anvendte dage i forløb ud over den anbefalede forløbstid samt forløbsperioden for 25 henholdsvis 75 kvartil forløbet for denne del af den samlede forløbstid.

Det maksimale antal anvendte dage i 2013 var 1.405 mod 568 dage i 2016. Det maksimale antal anvendte dage ud over de anbefalede forløbstider faldt vedvarende over perioden. Desuden ses, at alle fem regioner maksimalt anvendte færre dage i 2016 i forhold til i 2013, undtagen i Region Sjælland, *se bilag 9*.

Antallet af dage ud over den anbefalede forløbstid for 25 kvartil forløbet faldt fra 13 dage i 2013 til 10 dage i 2016. Ligeledes faldt antal anvendte dage for 75 kvartil forløbet fra 78 dage i 2013 mod 50 dage i 2016. Dette er udtryk for, at af de forløb der anvendte mere end den anbefalede forløbstid, blev der anvendt færre dage for 25 procent henholdsvis 75 procent af disse forløb i 2016 i forhold til i 2013, *se bilag 1 og 9*.

11. Pakkeforløb for livmoderkræft

I 2013 blev 67 procent af pakkeforløbene for livmoderkræft gennemført inden for den anbefalede forløbstid mod 83 procent i 2016. Der ses en vedvarende stigning i perioden, *se tabel 8*.

For den forløbstid, der lå ud over de anbefalede forløbstider, ses, at den gennemsnitlige forløbstid faldt med 2,8 dage fra 2013 til 2016, median forløbstid faldt med 2 dage og forløbstid for 75 kvartil forløbet faldt med 3 dage.

Der skal være opmærksomhed på, at Region Hovedstaden gennemførte flest pakkeforløb for livmoderkræft i 2013 og 2014, hvorimod Region Midtjylland gennemførte flest forløb i 2015 og 2016, *se bilag 10*.

Ligeledes skal der være opmærksomhed på, at implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på tallene i 2016.

Tabel 8 Andel forløb OF₄* inden for anbefalede forløbstider** for livmoderkræft, fordelt efter sygehusregion, procent, 2013-2016.

	2013	2014	2015	2016
Nordjylland	60	70	72	74
Midtjylland	64	64	70	83
Syddanmark	70	87	86	92
Hovedstaden	71	64	67	80
Sjælland	61	-	74	91
Hele landet	67	71	73	83

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling'.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 29 dage

793 pakkeforløb for livmoderkræft blev gennemført i 2013, hvorimod der blev gennemført 670 forløb i 2016, *se figur 29*.


Antallet af pakkeforløb, hvor der blev anvendt flere dage end anbefalet, faldt ligeledes vedvarende over perioden, hvor der i 2013 var 261 pakkeforløb mod 116 forløb i 2016, *se bilag 10*.

I 2013 ses omkring 70 forløb med yderligere anvendelse af 4-7 dage, 8-15 dage og 16+ dage ud over den anbefalede forløbstid. I 2014 ses flest forløb med anvendelse af yderligere 4-7 dage og 8-15 dage. I 2016 ses 40 forløb, hvor der yderligere blev anvendt 4-7 dage, som det højeste antal, *se figur 29*.


Andel forløb med anvendelse af 16+ dage mere end anbefalede forløbstid faldt vedvarende fra 8,8 procent i 2013 til 3,7 procent i 2016. For gruppen med anvendelse af yderligere 8-15 dage

faldt andel forløb ligeledes fra 9,0 procent i 2013 mod 4,6 procent i 2016. For de sidste to grupper 1-3 dage og 4-7 dage ses ligeledes lavere andele af forløb i 2016 i forhold til i 2013, *se figur 30*.

Figur 29 Antal forløb OF4* livmoderkræft uanset forløbstid, antal forløb OF4 med anvendelse af flere dage forløb end anbefalet**, fordelt efter antal dage anvendt ud over anbefalede forløbstid, 2013-2016.



Figur 30 Andel forløb OF4* livmoderkræft med anvendelse af flere dage end anbefalet i forløb**, fordelt efter overskridelsestid i antal dage, procent, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 29 dage.


Der ses regionale forskelle i andel forløb, der anvender mere end den anbefalede forløbstid. Da antallet af disse forløb er forholdsvis lavt, når de er opgjort fordelt på grupperne, vil der ikke blive kommenteret yderligere på disse, *se bilag 10*.

Det gennemsnitlige antal dage, der blev anvendt ud over den anbefalede forløbstid, faldt vedvarende fra 15,5 dage i 2013 til 12,7 dage i 2016. Antallet af dage anvendt for median forløbet faldt ligeledes fra 9 dage i 2013 til 7 dage i 2016, *se figur 31 og 32*.


I tre ud af de fem regioner faldt gennemsnittet i anvendte dage ud over de anbefalede forløbstider fra 2013 til 2016. I de resterende regioner Nordjylland og Hovedstaden faldt gennemsnittet fra 2014 til 2016. Den regionale variation var mindre i 2016 sammenlignet med variationen i 2013, *se figur 31*.

Der ses ligeledes regionale forskelle i anvendte antal dage for median forløbet for tiden ud over de anbefalede forløbstider, hvor Region Midtjylland vedvarende anvender færre dage end landstallet, *se figur 32*.

Figur 31 Gennemsnit i dage af anvendt tid ud over anbefalede forløbstid OF4* livmoderkræft, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Figur 32 Antal dage for median forløbet for den anvendte tid ud over anbefalede forløbstid OF4* livmoderkræft, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 29 dage.

Overstående bør ses i sammenhæng med det maksimale antal anvendte dage i forløb ud over den anbefalede forløbstid samt forløbsperioden for 25 henholdsvis 75 kvartil forløbet for denne del af den samlede forløbstid.

I 2013 var det maksimale antal anvendte dage 676 mod 140 dage i 2016. Det maksimale antal anvendte dage ud over de anbefalede forløbstider faldt vedvarende over perioden. Desuden ses, at fire ud af fem regioner maksimalt havde anvendt færre dage i 2016 i forhold til i 2013, undtaget Region Hovedstaden, se bilag 10.

Antal anvendte dage ud over den anbefalede forløbstid for 25 kvartil forløbet faldt fra 9 dage i 2013 til 7 dage i 2016. Ligeledes faldt antallet af anvendte dage for 75 kvartil forløbet fra 16 dage i 2013 mod 13 dage i 2016. Dette er udtryk for, at af de forløb der anvendte mere end den anbefalede forløbstid, blev der anvendt færre dage for 25 procent henholdsvis 75 procent af disse forløb i 2016 i forhold til i 2013, se bilag 1 og 10.

12. Pakkeforløb for kræft i æggestok

Andel pakkeforløb for kræft i æggestok, der blev gennemført inden for anbefalede forløbstider, steg med 6 procentpoint fra 2013 til 2016. Andel forløb var 67 procent i 2013 mod 73 procent i 2016, dog med en mellemliggende andel på 77 procent i 2015, *se tabel 9*.

For den forløbstid, der lå ud over de anbefalede forløbstider, ses, at den gennemsnitlige forløbstid faldt med 21,2 dage fra 2013 til 2016, median forløbstid faldt med 2 dage og forløbstid for 75 kvartil forløbet faldt med 3 dage.

Der skal være opmærksomhed på, at Region Hovedstaden gennemførte flest pakkeforløb for kræft i æggestok i 2013, hvorimod regionerne Syddanmark og Midtjylland gennemførte flest forløb 2014-2016, *se bilag 11*.

Ligeledes skal der være opmærksomhed på, at implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på tallene i 2016.

Tabel 9 Andel forløb OF4* inden for anbefalede forløbstider** for kræft i æggestok, fordelt efter sygehusregion, procent, 2013-2016.

	2013	2014	2015	2016
Nordjylland	-	82	77	83
Midtjylland	75	76	87	71
Syddanmark	64	76	81	85
Hovedstaden	58	53	59	64
Sjælland	-	-	-	49
Hele landet	67	70	77	73

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 24 dage og kemoterapi med 27 dage.


Andel forløb angivet med '-' ved antal forløb 0-10.

785 pakkeforløb for kræft i æggestok blev gennemført i 2013 med et efterfølgende fald til 614 forløb i 2015 efterfulgt af 662 forløb i 2016, *se figur 33*.


Antallet af pakkeforløb, hvor der blev anvendt flere dage end anbefalet, faldt ligeledes til og med 2015 efterfulgt af en stigning med 33 forløb til 2016. Der ses 260 pakkeforløb i 2013 mod 177 i 2016, *se bilag 11*.

I 2013 anvendte 65 forløb yderligere 8-15 dage og 16+ dage ud over den anbefalede forløbstid, svarende til en andel på 8,3 procent for hver af grupperne. Den største gruppe med 70 forløb anvendte yderligere 1-3 dage svarende til 8,9 procent af alle medtagne forløb. I 2016 ses flest forløb med anvendelse af yderligere 4-7 dage med 55 forløb, hvilket svarede til 8,3 procent af forløbene, *se figur 34*.

Figur 33 Antal forløb OF4* kræft i æggestok uanset forløbstid, antal forløb OF4 med anvendelse af flere dage forløb end anbefalet**, fordelt efter antal dage anvendt ud over anbefalede forløbstid, 2013-2016.



Figur 34 Andel forløb OF4* kræft i æggestok med anvendelse af flere dage end anbefalet i forløb**, fordelt efter overskridelsestid i antal dage, procent, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 24 dage og kemoterapi med 27 dage.


Der ses regionale forskelle i andel forløb, der anvender mere end den anbefalede forløbstid. Da antallet af disse forløb er forholdsvis lavt samt hovedsageligt er fordelt på tre ud af de fem regioner, når de er opgjort fordelt på grupperne, vil der ikke blive kommenteret yderligere på disse, se bilag 11.

Det gennemsnitlige antal dage, der blev anvendt ud over den anbefalede forløbstid, faldt vedvarende fra 32,3 dage i 2013 til 11,1 dage i 2016. Antallet af dage anvendt for median forløbet faldt fra 8 dage i 2013 til 6 dage i resterende år, se figur 35 og 36.

I tre ud af de fem regioner faldt gennemsnittet i anvendte dage ud over de anbefalede forløbstider fra 2013 til 2016. I de resterende regioner Nordjylland og Hovedstaden faldt gennemsnittet fra 2014 til 2016. Derudover var den regionale variation mindre i 2016 i forhold til de regionale forskelle i 2013, se figur 35.

Der ses regionale forskelle i anvendte antal dage for median forløbet for tiden ud over de anbefalede forløbstider, hvor Region Midtjylland vedvarende anvender færre dage eller tilsvarende antal dage som landstallet, se figur 36.

Figur 35 Gennemsnit i dage af anvendt tid ud over anbefalede forløbstid OF4* kræft i æggestok, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Figur 36 Antal dage for median forløbet for den anvendte tid ud over anbefalede forløbstid OF4* kræft i æggestok, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 24 dage og kemoterapi med 27 dage.

Overstående bør ses i sammenhæng med det maksimalt antal anvendte dage i forløb ud over den anbefalede forløbstid samt forløbsperioden for 25 henholdsvis 75 kvartil forløbet for denne del af den samlede forløbstid.

Det maksimale antal anvendte dage ud over de anbefalede forløbstider faldt vedvarende over perioden. I 2013 var det maksimale antal anvendte dage 1.541 mod 99 dage i 2016. Desuden ses, at fire ud af fem regioner maksimalt anvendte færre dage i 2016 i forhold til i 2013, undtaget Region Sjælland. Derudover var den regionale variation mindre i 2016 sammenlignet med 2013, se bilag 11.

Antal anvendte dage ud over den anbefalede forløbstid for 25 kvartil forløbet var nogenlunde på samme niveau over perioden med 2-3 dage. Antallet af anvendte dage for 75 kvartil vekslede over årene fra 15 dage (2013) og 16 dage i 2015, som det højeste, til 12 dage i 2014 og 2016, som det laveste. Dette er udtryk for, at af de forløb der anvendte mere end den anbefalede forløbstid, blev der anvendt nogenlunde det samme antal dage for 25 procent af disse forløb, hvorimod der blev anvendt færre dage for 75 procent af disse forløb i 2016 i forhold til i 2013, se bilag 1 og 11.

13. Pakkeforløb for modernærkekræft i hud

Andelen af pakkeforløb for modernærkekræft i hud, som blev gennemført inden for den anbefalede forløbstid, var 96 procent i tre ud af de fire år undtaget 2014, hvor andelsprocenten var 97, se tabel 10.

For den forløbstid, der lå ud over de anbefalede forløbstider, ses, at den gennemsnitlige forløbstid faldt med 32,5 dage fra 2013 til 2016, median forløbstid faldt med 3 dage og forløbstid for 75 kvartil forløbet faldt med 2 dage, med væsentlige udsving øvrige år.

Der skal være opmærksomhed på, at Region Syddanmark gennemførte flest pakkeforløb for modernærkekræft i hud hvert af årene i 2014-2016, hvorimod der var flest pakkeforløb i Region Hovedstaden i 2013, se bilag 12.

Ligeledes skal der være opmærksomhed på, at implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på tallene i 2016.

Tabel 10 Andel forløb OF4* inden for anbefalede forløbstider** for modernærkekræft i hud, fordelt efter sygehusregion, procent, 2013-2016.

	2013	2014	2015	2016
Nordjylland	-	-	-	98
Midtjylland	-	-	-	-
Syddanmark	-	96	97	96
Hovedstaden	94	97	95	93
Sjælland	-	-	95	96
Hele landet	96	97	96	96

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 31 dage.

Andel forløb angivet med '-' ved antal forløb 1-10.


Over 2.200 pakkeforløb for modernærkekræft i hud blev gennemført i hvert af årene 2013-2016 med det højeste antal i 2016 med 2.682 forløb, se figur 37.

80 pakkeforløb anvendte flere dage end anbefalet i 2013 mod 120 forløb i 2016, se bilag 12.


I 2013 og 2014 ses flest forløb, hvor der yderligere blev anvendt 16+ dage, med 25 forløb begge år. Derimod var der flest forløb i 2015, hvor der yderligere var blevet anvendt 1-7 dage og for 2016 var dette gældende for forløb med yderligere anvendelse af 1-3 dage (35 forløb), se figur 37.

Andelen af forløb, hvor der blev anvendt mere end den anbefalede forløbstid, var cirka 1 procent alle fire år uanset antallet af dage, der var blevet anvendt yderligere, se figur 38.

Figur 37 Antal forløb OF4* modernærkekræft i hud uanset forløbstid, antal forløb OF4 med anvendelse af flere dage forløb end anbefalet**, fordelt efter antal dage anvendt ud over anbefalede forløbstid, 2013-2016.



Figur 38 Andel forløb OF4* modernærkekræft i hud med anvendelse af flere dage end anbefalet i forløb**, fordelt efter overskridelsestid i antal dage, procent, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 31 dage.


Grundet det lave antal forløb, hvor der er anvendt flere dage end den anbefalede forløbstid, beskrives antallet og andelen af forløb ikke yderligere, se bilag 12.

Det gennemsnitlige antal dage, der blev anvendt ud over den anbefalede forløbstid, faldt vedvarende fra 2014 (56,9 dage) til 17,1 dage i 2016. Antallet af dage anvendt for median forløbet var 10 dage i 2013 mod 7 dage i 2016, se figur 39 og 40.


Den regionale variation i det gennemsnitlige anvendte antal dage ud over de anbefalede forløbstider var mellem 229,8 dage og 9,5 dage i 2013, hvorimod forskellene i 2016 var mellem 34,4 dage og 8,6 dage. Den regionale variation var derfor mindre i 2016 i forhold til de regionale forskelle i 2013, se figur 39.

Ligeledes ses regionale forskelle i det anvendte antal dage for median forløbet for tiden ud over de anbefalede forløbstider, hvor forskellen var mellem 2 og 17 dage i 2013 mod 5 til 10 dage i 2016, se figur 40.

Figur 39 Gennemsnit i dage af anvendt tid ud over anbefalede forløbstid OF4* modernærkekræft i hud, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Figur 40 Antal dage for median forløbet for den anvendte tid ud over anbefalede forløbstid OF4* modernærkekræft i hud, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 43 dage, kemoterapi med 44 dage og strålebehandling 48 dage.

Overstående bør ses i sammenhæng med det maksimalt antal anvendte dage i forløb ud over den anbefalede forløbstid samt forløbsperioden for 25 henholdsvis 75 kvartil forløbet for denne del af den samlede forløbstid.

Der blev maksimalt anvendt 1.160 dage ud over den anbefalede forløbstid i 2014 mod 351 dage i 2016. Det maksimale antal anvendte dage ud over de anbefalede forløbstider faldt fra og med 2014. Desuden anvendte fire ud af fem regioner maksimalt færre dage i 2016 i forhold til i 2013, se bilag 12.

Antal anvendte dage ud over den anbefalede forløbstid for 25 kvartil forløbet faldt fra 3 dage i 2013 til 2 dage i 2015 og 2016. Antallet af anvendte dage for 75 kvartil forløbet er mere varieret over perioden med højeste antal dage i 2014 med 25 dage mod 12 dage i 2015, som det laveste. Dog ses et fald på 2 dage fra 2013 til 2016, hvor der blev anvendt 14 dage. Dette er udtryk for, at af de forløb der anvendte mere end den anbefalede forløbstid, blev der anvendt en dag mindre for 25 procent af disse forløb, hvorimod billedet for 75 procent af disse forløb er noget mere varieret, dog med et fald fra 2013 til 2016 på 2 dage, se bilag 1 og 12.

14. Pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Andelen af pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi, som blev gennemført inden for den anbefalede forløbstid, var 88 procent i 2013 stigende til 92 procent i 2015. I 2016 var andelen faldet til 87 procent, *se tabel 11*.

For den forløbstid, der lå ud over de anbefalede forløbstider, ses, at den gennemsnitlige forløbstid faldt med 29,7 dage fra 2013 til 2016, median forløbstid faldt med 1 dage og forløbstid for 75 kvartil forløbet faldt med 3 dage.

Der skal være opmærksomhed på, at Region Hovedstaden gennemførte flest pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi hvert af årene i 2013-2016. Dog ses, at regionerne Midtjylland og Syddanmark gennemførte næsten lige så mange forløb som Region Hovedstaden i 2016, *se bilag 13*.

Ligeledes skal der være opmærksomhed på, at implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på tallene i 2016.

Tabel 11 Andel forløb OF₄* inden for anbefalede forløbstider** for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi, fordelt efter sygehusregion, procent, 2013-2016.

	2013	2014	2015	2016
Nordjylland	-	86	-	-
Midtjylland	93	-	95	90
Syddanmark	88	91	-	87
Hovedstaden	89	84	90	84
Sjælland	-	-	-	-
Hele landet	88	90	92	87

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling'.

**Anbefalede forløbstid angivet for kemoterapi med 31 dage og strålebehandling med 43 dage.

Andel forløb angivet med '-' ved antal forløb 1-10.


Der blev gennemført 917 pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi i 2013. Antal forløb var på nogenlunde samme niveau i 2016 med 908 forløb. I de mellemliggende år blev der gennemført omkring 850 forløb, *se figur 41*.

Antallet af pakkeforløb, hvor der blev anvendt flere dage end anbefalet, var i 2013 110 forløb mod 115 forløb i 2016 med et noget lavere antal i de mellemliggende år, *se bilag 13*.


I tre ud af de fire år ses flest forløb, hvor der blev anvendt 16+ dage yderligere, hvorimod der var flest forløb med anvendelse af 1-3 dage i 2015, se figur 41.

Tilsvarende ses, at andel forløb med anvendelse af 16+ dage ud over den anbefalede forløbstid, var højest i 2013, 2014 og 2016, hvorimod andel forløb, hvor der blev anvendt 1-3 dage yderligere var højest i 2015, se figur 42.

Figur 41 Antal forløb OF4* for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi uanset forløbstid, antal forløb OF4 med anvendelse af flere dage forløb end anbefalet**, fordelt efter antal dage anvendt ud over anbefalede forløbstid, 2013-2016.



Figur 42 Andel forløb OF4* for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi med anvendelse af flere dage end anbefalet i forløb**, fordelt efter overskridelsestid i antal dage, procent, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

** Anbefalede forløbstid angivet for kemoterapi med 31 dage og strålebehandling med 43 dage.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10.


Grundet det lave antal forløb, hvor der er anvendt flere dage end den anbefalede forløbstid, beskrives dette ikke yderligere for antal og andel forløb, se bilag 13.

Det gennemsnitlige antal dage, der blev anvendt ud over de anbefalede forløbstider, faldt vedvarende fra 51,2 dage i 2013 til 19,3 dage i 2015 med en efterfølgende stigning til 21,5 dage i 2016. Antallet af dage anvendt for median forløbet var 11 dage i 2013 mod 10 dage i 2016 med et lavere antal dage i de mellemliggende år, se figur 43 og 44.


Den regionale variation i det gennemsnitlige anvendte antal dage ud over de anbefalede forløbstider var mellem 99,1 dage og 16,1 dage i 2013, hvor forskellene i 2016 var mellem 37,7 dage og 8,7 dage. Tallene skal vurderes med varsomhed grundet statistisk usikkerhed, da antallet af forløb er forholdsvis lavt, når de er fordelt efter region, se figur 43.

Ligeledes ses regionale forskelle i det anvendte antal dage for median forløbet for tiden ud over de anbefalede forløbstider, hvor forskellen var mellem 4 og 12 dage i 2013 mod 6 til 14 dage i 2016. Variationen var mindst i 2015, se figur 44.

Figur 43 Gennemsnit i dage af anvendt tid ud over anbefalede forløbstid OF4* for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Figur 44 Antal dage for median forløbet for den anvendte tid ud over anbefalede forløbstid OF4* for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

Anbefalede forløbstid angivet for kemoterapi med 31 dage og strålebehandling med 43 dage.

Overstående bør ses i sammenhæng med det maksimalt anvendte dage i forløb ud over den anbefalede forløbstid samt forløbsperioden for 25 henholdsvis 75 kvartil forløbet for denne del af den samlede forløbstid.

Der blev maksimalt anvendt 1.470 dage ud over den anbefalede forløbstid i 2013 mod 530 dage i 2016. Det maksimale antal anvendte dage ud over de anbefalede forløbstider faldt fra 2013 til 2015 efterfulgt af en stigning med lidt under 100 dage til 2016. Derudover anvendte fire ud af fem regioner maksimalt færre dage i 2016 i forhold til i 2013, undtagen i Region Sjælland, se bilag 13.

Antal anvendte dage ud over den anbefalede forløbstid for 25 kvartil forløbet faldt fra 4 dage i 2013 til 2 dage i 2015 og i 2016 3 dage. Antallet af anvendte dage for 75 kvartil forløbet var mere varieret over perioden med højeste antal dage i 2013 på 22 dage mod 17 dage i 2014 og 2015, som det laveste, samt 19 dage i 2016, se bilag 1 og 13.

15. Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen

78 procent af pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen blev gennemført inden for den anbefalede forløbstid mod 76 procent i 2016. Den laveste andel forløb ses i 2015 med 73 procent, *se tabel 12*.

For den forløbstid, der lå ud over de anbefalede forløbstider, ses, at den gennemsnitlige forløbstid faldt med 24,2 dage fra 2013 til 2016, median forløbstid faldt med 3 dage fra 2014 til 2016 og forløbstid for 75 kvartil forløbet faldt med 4 dage fra 2013 til 2016 med 19 dage.

Der skal være opmærksomhed på, at Region Hovedstaden gennemførte flest pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen i 2013, hvorimod Region Syddanmark gennemførte flest forløb i 2014-2016, *se bilag 14*.

Ligeledes skal der være opmærksomhed på, at implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på tallene i 2016.

Tabel 12 Andel forløb OF4* inden for anbefalede forløbstider** for kræft i bugspytkirtlen, procent, hele landet, 2013-2016.

	2013	2014	2015	2016
Hele landet	78	77	73	76

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 43 dage, kemoterapi med 44 dage og strålebehandling 48 dage.

Andel forløb angivet med '-' ved antal forløb 1-10.


445 pakkeforløb blev gennemført i 2013 med et efterfølgende vedvarende fald til 375 forløb i 2016, *se figur 45*.

Antallet af pakkeforløb, hvor der blev anvendt flere dage end anbefalet, var cirka 100 forløb i 2013 og 2014 mod 115 forløb i 2015. I 2016 ses det laveste antal af disse pakkeforløb med 90 forløb, *se bilag 14*.


For alle fire år ses flest forløb, hvor der yderligere var anvendt 16+ dage med 40 forløb i 2013 stigende til 50 forløb i 2015 med efterfølgende fald til 30 forløb i 2016. I 2013, 2014 og 2016 ses færrest forløb med yderligere anvendelse af 1-3 dage, hvorimod der i 2015 ses færrest forløb i gruppen med anvendelse af yderligere 4-7 dage, *se figur 45*.

Andel forløb med yderligere anvendelse af 16+ dage var 9,0 procent stigende til 11,7 procent i 2015 med et efterfølgende fald til 8,0 procent i 2016. For øvrige grupper ses desuden højere andele forløb i 2016 i forhold til andel forløb i 2013, *se figur 46*.

Figur 45 Antal forløb OF4* kræft i bugspytkirtlen uanset forløbstid, antal forløb OF4 med anvendelse af flere dage forløb end anbefalet**, fordelt efter antal dage anvendt ud over anbefalede forløbstid, 2013-2016.



Figur 46 Andel forløb OF4* kræft i bugspytkirtlen med anvendelse af flere dage end anbefalet i forløb**, fordelt efter overskridelsestid i antal dage, procent, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 43 dage, kemoterapi med 44 dage og strålebehandling 48 dage.

Antal forløb under 5 angivet med '-'. Andel forløb angivet med '-' ved antal forløb under eller lig med 10.


Der ses regionale forskelle i andel forløb, der anvender mere end den anbefalede forløbstid. Da antallet af disse forløb er forholdsvis lavt, foretages der ikke yderligere analyse af disse, se bilag 14.

Det gennemsnitlige antal dage, der blev anvendt ud over den anbefalede forløbstid, faldt vedvarende fra 43,6 dage i 2013 til 19,4 dage i 2016. Antallet af dage anvendt for median forløbet var 11 dage i 2013 og i 2016. Dog blev der anvendt flere dage i 2014 (14 dage) og 2015 (13 dage), se figur 47 og 48.


Den regionale variation i det gennemsnitlige anvendte antal dage ud over de anbefalede forløbstider var i 2013 mellem 84,6 dage og 13,7 dage. I 2016 var forskellene mindre mellem 21,8 dage og 10,9 dage. Tallene skal vurderes med varsomhed grundet statistisk usikkerhed, da antallet af forløb er forholdsvis lavt, når de er fordelt efter region, se figur 47.

Ligeledes ses regionale forskelle i anvendte antal dage for median forløbet for den anvendte tid ud over de anbefalede forløbstider, hvor forskellen var mellem 7 dage og 23 dage i 2013, hvorimod variationen var mellem 6 til 16 dage i 2016, se figur 48.

Figur 47 Gennemsnit i dage af anvendt tid ud over anbefalede forløbstid OF4* kræft i bugspytkirtlen, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Figur 48 Antal dage for median forløbet for den anvendte tid ud over anbefalede forløbstid OF4* kræft i bugspytkirtlen, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 43 dage, kemoterapi med 44 dage og strålebehandling 48 dage.

Overstående bør ses i sammenhæng med det maksimalt antal anvendte dage i forløb ud over den anbefalede forløbstid samt forløbsperioden for 25 henholdsvis 75 kvartil forløbet for denne del af den samlede forløbstid.

Der blev maksimalt anvendt 665 dage ud over den anbefalede forløbstid i 2013 mod 185 dage i 2016. Det maksimale antal anvendte dage ud over de anbefalede forløbstider faldt vedvarende over perioden med det største fald fra 2013 til 2014. Desuden ses, at alle regioner maksimalt har anvendt færre dage i 2016 sammenlignet med i 2013, se bilag 14.

Antal anvendte dage ud over den anbefalede forløbstid for 25 kvartil forløbet steg med en dag fra 4 dage i 2013 til 5 dage i 2016. Hvorimod antallet af anvendte dage for 75 kvartil forløbet faldt fra 23 dage i 2013 mod 19 dage i 2016, dog med anvendelse af 31 dage i 2015, som det højeste. Dette er udtryk for, at af de forløb, der anvendte mere end den anbefalede forløbstid, blev der anvendt lidt længere tid for 25 procent af de forløb, der anvendte færrest dage yderligere. Hvorimod der for 75 procent forløb ses, at der blev anvendt færre dage i 2016 i forhold til i 2013, se bilag 1 og 14.

16. Pakkeforløb for spiserøret, mavemunden og mavesækken

Andelen af pakkeforløb for kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken, der blev gennemført inden for den anbefalede forløbstid, var 78 procent i 2013 mod 80 procent i 2016. Den højeste andel forløb ses i 2015 med 84 procent, *se tabel 13*.

For den forløbstid, der lå ud over de anbefalede forløbstider, ses, at den gennemsnitlige forløbstid faldt med 9,8 dage fra 2014 til 2016, median forløbstid faldt med 2 dage fra 2013 til 2016 og forløbstid for 75 kvartil forløbet faldt fra 2013 til 2016 med 8 dage.

Der skal være opmærksomhed på, at Region Hovedstaden gennemførte flest pakkeforløb for kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken i 2013, hvorimod Region Syddanmark gennemførte flest forløb i 2014-2016, *se bilag 15*.

Ligeledes skal der være opmærksomhed på, at implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på tallene i 2016.

Tabel 13 Andel forløb OF4* inden for anbefalede forløbstider** for kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken, procent, hele landet, 2013-2016.

	2013	2014	2015	2016
Nordjylland	-	-	-	-
Midtjylland	83	86	84	79
Syddanmark	87	-	93	84
Hovedstaden	70	70	74	74
Sjælland	-	-	-	-
Hele landet	78	81	84	80

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 43 dage og kemoterapi med 51 dage.

Andel forløb angivet med '-' ved antal forløb 1-10.


522 pakkeforløb blev gennemført i 2013 med et efterfølgende fald til 459 forløb i 2014, hvilket steg til 532 forløb i 2016, *se figur 47*.

Antallet af pakkeforløb, hvor der blev anvendt flere dage end anbefalet, var 117 forløb i 2013 mod cirka 80 forløb i øvrige år 2014-2016, *se bilag 15*.


For årene 2013-2015 ses flest forløb, hvor der yderligere var anvendt 16+ dage, og der var næstflest forløb, hvor der yderligere blev anvendt 8-15 dage. I 2016 ses flest forløb, hvor der yderligere blev anvendt 4-7 dage, hvor der næsthøjest var anvendt 16+ dage yderligere i 2016, *se figur 47*.

Andel forløb med yderligere anvendelse af 16+ dage var 8,6 procent i 2013 med et efterfølgende fald til 5,6 procent i 2016, dog med lidt højere andele forløb i mellemliggende år, se figur 48.

Figur 49 Antal forløb OF4* kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken uanset forløbstid, antal forløb OF4 med anvendelse af flere dage forløb end anbefalet**, fordelt efter antal dage anvendt ud over anbefalede forløbstid, 2013-2016.



Figur 50 Andel forløb OF4* kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken med anvendelse af flere dage end anbefalet i forløb**, fordelt efter overskridelsestid i antal dage, procent, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 43 dage og kemoterapi med 51 dage.

Antal forløb under 5 angivet med '-'. Andel forløb angivet med '-' ved antal forløb under eller lig med 10.


Der ses regionale forskelle i andel forløb, der anvender mere end den anbefalede forløbstid. Da antallet af disse forløb er forholdsvis lavt, foretages der ikke yderligere analyse af disse, se bilag 15.

I gennemsnit blev der anvendt lidt over 27 dage ud over de anbefalede forløbstider i 2013-2014 med et efterfølgende fald til 2016 med 17,6 dage i gennemsnit. Desuden blev der anvendt 11 dage i forløb for median forløbet i 2013 og 2015 mod 9 dage i 2014 og 2016, se figur 49 og 50.


Desuden ses regionale forskelle, hvor det gennemsnitlige antal dage, der blev anvendt ud over den anbefalede forløbstid, faldt mest i Region Midtjylland fra 34,4 dage i 2013 mod 14,1 dage i 2016. Hvorimod gennemsnittet steg mest i Region Nordjylland fra 16 dage i 2013 til 31,8 dage i 2016 med et højere antal gennemsnitlige dage i 2015, se figur 49.

Ligeledes ses regionale forskelle for median forløbet for den anvendte tid ud over de anbefalede forløbstider, hvor tre ud af fire regioner ligger tæt omkring landstallet, mens Region Nordjylland anvender flere dage end landstallet i hele perioden, se figur 50.

Figur 51 Gennemsnit i dage af anvendt tid ud over anbefalede forløbstid OF4* kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Figur 52 Antal dage for median forløbet for den anvendte tid ud over anbefalede forløbstid OF4* kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.



Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling'.

Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 43 dage og kemoterapi med 51 dage.

Overstående bør ses i sammenhæng med det maksimalt antal anvendte dage i forløb ud over den anbefalede forløbstid samt forløbsperioden for 25 henholdsvis 75 kvartil forløbet for denne del af den samlede forløbstid.

Der blev maksimalt anvendt 469 dage ud over den anbefalede forløbstid i 2013 mod 173 dage i 2016. Det maksimale antal anvendte dage ud over de anbefalede forløbstider var dog lavest i 2015 med 130 dage. Ligeledes ses, at de tre regioner, der varetager flest pakkeforløb, maksimalt anvender færre dage i 2016 i forhold til i 2013, se bilag 15.

For 25 kvartil forløbet blev der anvendt yderligere 5 dage i 2013 og i 2015 mod 4 dage i 2016. Hvorimod antallet af anvendte dage for 75 kvartil forløbet faldt fra 24 dage i 2013 mod 16 dage i 2016, dog med anvendelse af 26 dage i 2015, som det højeste antal. Dette er udtryk for, at af de forløb, der anvendte mere end den anbefalede forløbstid, blev der anvendt lidt færre dage i 2016 i forhold til i 2013 for 25 procent af de forløb, der anvendte de korteste forløbstider ud over anbefalet. Ligeledes blev der anvendt færre dage i 2016 for 75 procent af de forløb med de korteste forløbstider udover i forhold til i 2013, se bilag 1 og 15.

Bilag 1 Metode

Datakilde

Grundlaget for analysen er data fra Landspatientregisteret for årene 2013 til 2016 opgjort per 15. januar 2018, hvorfor data kan afvige fra allerede offentliggjorte tal for pågældende år.

Inklusion- og eksklusionskriterier


Bag datagrundlaget ligger samme beregningsmodel som ligger til grund for monitoreringsmodellen for kræftområdet, hvor en indikator opgøres, hvis der findes registrering af et start og et slutpunkt, hvilket vil sige et fuldt registreret forløb. Opgørelserne anvender de dedikerede koder, der bliver anvendt til registrering af definerede målepunkter i pakkeforløb for kræftområdet. Registreringsmodellen blev indført i sommeren 2012 med implementeringsfrist for regionerne 1. oktober 2012.

Datagrundlaget indeholder patientforløb medtaget i opgørelse af 'forløbsperiode OF4' i pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype. Opgørelse af indikatoren OF4 anvender som startpunkt for indikatoren registrering af pakkeforløb start med AFBxxA 'henvi-
sing til pakkeforløb start'. Registrering af AFBxxA 'henvi-
sing til pakkeforløb start' bestemmer hvilket år og hvilken sygehusregion data tilskrives. Slutpunktet registreres med AFBxxF 'initial behandling start' fordelt efter behandlingsform, som er defineret som kirurgisk, nervebesparende kirurgi, medicinsk (kemoterapi) og strålebehandling. Slutpunktet for indikatoren er registreret inden opgørelsestidspunktet den 15. januar 2018 for alle årene 2013 - 2016, for at forløbet medtages i denne opgørelse, se boks A.

Boks A. Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype – samlet tid til behandling OF4

Opgørelse af 'samlet tid til behandling' OF4

De anbefalede forløbstider er specifikke for hver kræfttype med specifik behandlingsform (se bilag 2).



De anbefalede forløbstider er specifik for hvert pakkeforløb med tilhørende behandlingsform. I analysen medtages alene pakkeforløb, hvor der er angivet anbefalede forløbstider, dog undtaget pakkeforløb for tarmmetastaser i leveren (nr. 11), se bilag 2.

Opgørelsen foretages for hvert kræftområde i en samlet population uanset behandlingsformer.

Opgørelser

Antal pakkeforløb for specifikke kræftområdet

Antal pakkeforløb for specifikke kræftområdet anvendes som nævner ved beregning af andele forløb inden for anbefalede forløbstid samt andele forløb med anvendelse af yderligere dage i forløb, se nedenfor.

Andel pakkeforløb gennemført inden for anbefalede forløbstider

Pakkeforløb gennemført inden for anbefalede forløbstider udarbejdes som andel for hver kræfttype med tilhørende behandlingsform, der er gennemført inden for de anbefalede forløbstider

i en samlet opgørelse, uanset om der er angivet forløbstider ved en eller flere behandlingsformer.

Tæller: antal pakkeforløb gennemført inden for anbefalede forløbstider for den specifikke kræfttype og behandlingsform i samlet opgørelse

Nævner: antal pakkeforløb for specifikke kræftområder uanset forløbstid

Andel pakkeforløb gennemført med anvendelse af flere dage end angivet

Pakkeforløb gennemført med anvendelse af flere dage end angivet som anbefalede forløbstid udarbejdes som antal og andel forløb for hver kræfttype med tilhørende behandlingsform i følgende grupper: 1-3 dage, 4-7 dage, 8-15 dage samt 16+dage.

Tæller: antal pakkeforløb for specifikke for specifikke kræftområdet med anvendelse af yderligere 1-3 dage, 4-7 dage, 8-15 dage samt 16+dage


Nævner: antal pakkeforløb for specifikke kræftområder uanset forløbstid

Gennemsnitlig forløbstid og forløbstid udover anbefalede forløbstider for nedre, median og øvre kvartil forløb

Derudover angives for hvert kræftområde gennemsnitlig forløbstid, anvendte antal dage for median forløbet samt 25 kvartil forløbet og 75 kvartil forløbet, for den forløbstid der er anvendt ud over de anbefalede forløbstider, se *boks B*.

Boks B. Anvendte dage for 25 (nedre)-, 50 (median) - og 75 (øvre) kvartil forløbet udover anbefalede forløbstider

For forløb, hvor der er anvendt yderligere dage ud over anbefalede forløbstid, er 25 kvartil (nedre), 50 kvartil (median) og 75 kvartil (øvre) forløbet opgjort for forløbsperioden udover anbefalede forløbstider i dage.



Kvartilen angiver det antal dage, der maksimalt er anvendt ud over anbefalede forløbstid i forløb for de 25 procent, 50 procent henholdsvis 75 procent af forløbene, hvor denne forløbsperiode er kortest.

Dette betyder, at antal anvendte dage for nedre kvartil -, median - og øvre kvartil forløbet, angiver det antal dage, der adskiller de 25, 50 henholdsvis 75 procent af forløbene med den korteste forløbstid ud over de anbefalede forløbstider med de 75, 50 henholdsvis 25 procent af forløbene med den længste forløbstid ud over anbefalede forløbstider i dage.

Minimale og maksimale antal anvendte dage i forløb ud over anbefalede forløbstider

Det minimale og maksimale antal dage anvendt i forløb ud over de anbefalede forløbstider angives ligeledes for hvert kræftområde.

Opgørelsesniveau

Opgørelserne udarbejdes fordelt efter sygehusregion for hvert af årene 2013-2016.

Data henføres til år og sygehusregion ud fra starttidspunktet for start af pakkeforløb medtaget i opgørelse af 'samlet tid til behandling OF4, svarende til anvendte metode ved monitorering af området.

Yderligere dokumentation

Nærmere beskrivelse af monitorering af pakkeforløb for kræftområdet for 'samlet tid til behandling OF4, organspecifik kræfttype', findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside på følgende link: <http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/monitoreringer/kræft>

Opmærksomhedspunkter

Der gøres opmærksom på, at registreringsmodellen blev implementeret i tredje kvartal 2012. 2013 er således det første hele år med tal for pakkeforløb for kræftområdet, med anvendelse af en nyligt indført registreringsmodel, hvorfor stigning i antallet af forløb ligeledes kan være udtryk for en forbedret registreringspraksis af forløbene.

Desuden skal der være opmærksomhed på, at den enkelte patient kan være medtaget i opgørelse med mere end et pakkeforløb med tilhørende behandlingsform(er) i det enkelte år samt over perioden. Af denne grund er det ikke muligt at summere på tværs af opgørelse.

Analysen anvender dynamiske data og medtager alle pakkeforløb for kræftområdet 'samlet tid til behandling OF4*', der er færdigregistreret og indberettet til Landspatientregisteret inden opgørelsestidspunktet den 15. januar 2018. Det er derfor ikke muligt at sammenligne med tidligere offentliggjorte tal.

Der skal desuden være opmærksomhed på, at der kan være relevante sundhedsfaglige grunde til længere forløbstider end de anbefalede forløbstider for de enkelte kræftområder med tilhørende behandlingsform.

Ligeledes skal der være opmærksomhed på, at metode for opgørelse med anvendelse af alle forløb 'samlet tid til behandling OF4*', der er færdigregistreret til og med opgørelsestidspunkt den 15. januar 2018, medfører, at forløb med start i 2013 kan have et længere forløb over en længere periode end forløb med start i 2016. Dette indebærer, at opgørelse af den maksimalt anvendte tid i forløb skal vurderes med forsigtighed.

Der skal være opmærksomhed, at Sundhedsstyrelsen i 2013 besluttede at implementere ny behandlingsform for pakkeforløb for prostatakræft med opdeling i kirurgisk behandling og nervebesparende kirurgi med ny registreringspraksis til følge fra og med 1. januar 2014. Dette kan have indflydelse på tallene, da pakkeforløb med nervebesparende kirurgi er blevet defineret med væsentlig længere forløbstid end for kirurgisk behandling, *se bilag 2*.

Desuden gøres opmærksom på, at implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data i 2016.

Diskretionering

Antal forløb fra 1-4 diskretioneres og maskeres med '-'. Derudover angives '-', hvis der for den enkelte kræfttype ikke findes forløb. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10.

Bilag 2 Pakkeforløb

Oversigt over pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype, med tilhørende forløbstider for 'samlet tid til behandling OF4'.

For nogle pakkeforløb er der ikke angivet standardforløbstider for alle de beskrevne perioder (markeret med '-'). De pågældende forløb vil ikke indgå i opgørelsen.

Derudover udelades følgende pakkeforløb ved opgørelse:

Pakke nr.	Kræfttype
11	Tarmkræftmetastaser i leveren

Pakkeforløb for tarmmetastaser i leveren (nr. 11) udelades, da patienter medtaget i dette pakkeforløbet ofte ligeledes er del af pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft. Derfor skønnes ikke hensigtsmæssigt at medtage dette forløb.

De anvendte indikatorer er som følger

OF4A	samlet tid til initial kirurgisk behandling
OF4A1	samlet tid til initial nervebesparende kirurgi
OF4B	samlet tid til medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi)
OF4C	samlet tid til strålebehandling

Pakke nr.	Kræfttype	OF4A	OF4A1	OF4B	OF4C
1	Brystkræft	27	-	-	-
2	Hoved- og halskræft	28	-	32	32
3	Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi	-	-	31	43
4	Myelomatose	-	-	-	-
5	Akut leukæmi/ fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)	-	-	6	-
6	Kroniske myeloide sygdomme	-	-	-	-
7	Kræft i bugspytkirtlen	43	-	44	48
8	Kræft i galdegang	43	-	44	48
9	Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken	43	-	51	-
10	Primær leverkræft	47	-	48	-
12	Kræft i tyk- og endetarm	37	-	37	41
14	Kræft i blæren	45	-	48	52
15	Kræft i nyre	45	-	45	-
16	Kræft i prostata	50	82	-	55
17	Kræft i penis	37	-	38	42
18	Kræft i testikel	-	-	-	-
19	Kræft i ydre kvindelige kønsorganer	36	-	-	43

Pakke nr.	Kræfttype	OF4A	OF4A1	OF4B	OF4C
20	Livmoderkræft	29	-	-	-
21	Kræft i æggestok	24	-	27	-
22	Livmoderhalskræft	28	-	31	35
23	Kræft i hjernen	22	-	-	-
24	Kræft i øje og orbita	-	-	-	-
25	Modermærkekræft i hud	31	-	-	-
26	Lungekræft	44	-	41	45
27	Sarkom i knogle	47	-	44	48
29	Sarkom i bløddele	35	-	32	36
30	Kræft hos børn	-	-	-	-
31	Analkræft	-	-	35	35
32	Kræft i nyrebækken eller urinleder	44	-	48	-
33	Lungehindekræft	-	-	41	-

Bilag 3 Dataopgørelser – brystkræft

Bilagstabel 1 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.
Brystkræft

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
2013															
Nordjylland	474	81	91	29	24	17	21	6,1	5,1	3,6	4,4	29,0	6	1	855
Midtjylland	620	87	83	15	12	15	41	2,4	1,9	2,4	6,6	171,6	15	1	1472
Syddanmark	887	85	136	47	26	27	36	5,3	2,9	3,0	4,1	35,5	7	1	1483
Hovedstaden	1.278	49	650	116	123	217	194	9,1	9,6	17,0	15,2	33,7	10	1	1481
Sjælland	570	62	217	59	50	64	44	10,4	8,8	11,2	7,7	12,1	7	1	271
Hele landet	3.829	69	1.177	266	235	340	336	6,9	6,1	8,9	8,8	39,3	9	1	1483
2014															
Nordjylland	496	74	128	36	29	26	37	7,3	5,8	5,2	7,5	19,6	7	1	574
Midtjylland	796	85	122	19	24	23	56	2,4	3,0	2,9	7,0	88,6	15	1	1188
Syddanmark	864	91	82	40	11	13	18	4,6	1,3	1,5	2,1	25,6	4	1	777
Hovedstaden	1.309	72	362	132	81	75	74	10,1	6,2	5,7	5,7	52,4	6	1	1233

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
Sjælland	572	85	86	32	21	23	10	5,6	3,7	4,0	0,0	8,9	6	1	73
Hele landet	4.037	81	780	259	166	160	195	6,4	4,1	4,0	4,8	45,0	7	1	1233
2015															
Nordjylland	447	70	132	35	26	36	35	7,8	5,8	8,1	7,8	26,0	8	1	586
Midtjylland	868	84	143	38	25	24	56	4,4	2,9	2,8	6,5	79,6	11	1	902
Syddanmark	844	89	89	42	24	10	13	5,0	2,8	0,0	1,5	24,9	4	1	823
Hovedstaden	1.216	79	261	102	67	60	32	8,4	5,5	4,9	2,6	30,0	5	1	836
Sjælland	590	89	66	24	17	14	11	4,1	2,9	2,4	1,9	14,2	6	1	241
Hele landet	3.965	83	691	241	159	144	147	6,1	4,0	3,6	3,7	37,4	6	1	902
2016															
Nordjylland	418	75	103	29	26	28	20	6,9	6,2	6,7	4,8	11,1	7	1	131
Midtjylland	764	87	96	26	12	11	47	3,4	1,6	1,4	6,2	56,6	15	1	618
Syddanmark	847	88	99	36	28	20	15	4,3	3,3	2,4	1,8	17,7	5	1	672
Hovedstaden	926	67	309	98	69	88	54	10,6	7,5	9,5	5,8	16,7	7	1	401
Sjælland	572	74	151	47	40	42	22	8,2	7,0	7,3	3,8	9,6	6	1	139
Hele landet	3.527	79	758	236	175	189	158	6,7	5,0	5,4	4,5	19,7	7	1	672

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 27 dage.

Bilagstabel 2 Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF₄* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid**
i dage, hele landet, 2013-2016
Brystkræft

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	3	1	1	1
50 kvartil, dage	9	7	6	7
75 kvartil, dage	16	15	13	13

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 27 dage.

Bilag 4 Dataopgørelser – lungekræft

Bilagstabel 3 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.
Lungekræft

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
2013															
Nordjylland	404	63	150	36	31	40	43	8,9	7,7	9,9	10,6	23,4	8	1	615
Midtjylland	693	74	178	31	30	39	78	4,5	4,3	5,6	11,3	89,9	12	1	1521
Syddanmark	979	72	274	43	51	66	114	4,4	5,2	6,7	11,6	30,2	12	1	521
Hovedstaden	767	68	244	48	44	58	94	6,3	5,7	7,6	12,3	31,7	11	1	1293
Sjælland	266	75	67	11	14	11	31	4,1	5,3	4,1	11,7	67,4	13	1	955
Hele landet	3.109	71	913	169	170	214	360	5,4	5,5	6,9	11,6	43,8	11	1	1521
2014															
Nordjylland	433	55	193	33	30	54	76	7,6	6,9	12,5	17,6	24,9	11	1	353
Midtjylland	770	75	189	29	32	45	83	3,8	4,2	5,8	10,8	78,9	13	1	967
Syddanmark	979	74	253	35	51	58	109	3,6	5,2	5,9	11,1	42,4	12	1	970
Hovedstaden	923	67	301	40	65	78	118	4,3	7,0	8,5	12,8	29,8	12	1	1016
Sjælland	262	77	59	9	11	12	27	-	4,2	4,6	10,3	115,7	15	1	1158

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
Hele landet	3.367	70	995	146	189	247	413	4,3	5,6	7,3	12,3	46,5	12	1	1158
2015															
Nordjylland	445	76	107	18	21	23	45	4,0	4,7	5,2	10,1	21,1	11	1	208
Midtjylland	795	75	198	26	37	42	93	3,3	4,7	5,3	11,7	83,3	15	1	856
Syddanmark	1.042	75	258	40	50	62	106	3,8	4,8	6,0	10,2	40,8	11,5	1	826
Hovedstaden	866	69	268	49	48	65	106	5,7	5,5	7,5	12,2	31,2	11	1	691
Sjælland	383	80	77	14	11	26	26	3,7	2,9	6,8	6,8	36,4	12	1	477
Hele landet	3.531	74	908	147	167	218	376	4,2	4,7	6,2	10,6	44,6	11	1	856
2016															
Nordjylland	478	73	130	24	27	34	45	5,0	5,6	7,1	9,4	20,6	11	1	273
Midtjylland	834	77	190	33	27	41	89	4,0	3,2	4,9	10,7	66,3	14	1	584
Syddanmark	1.059	78	228	36	40	63	89	3,4	3,8	5,9	8,4	24,9	12	1	504
Hovedstaden	614	63	225	38	45	54	88	6,2	7,3	8,8	14,3	20,8	11	1	371
Sjælland	374	83	63	12	11	19	21	3,2	2,9	5,1	5,6	25,3	11	1	575
Hele landet	3.359	75	836	143	150	211	332	4,3	4,5	6,3	9,9	32,6	11,5	1	584

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 44 dage, kemoterapi med 41 dage og strålebehandling med 45 dage.

Bilagstabel 4 Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF₄* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid** i dage, hele landet, 2013-2016
Lungekræft

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	4	4	4	4
50 kvartil, dage	11	12	11	11,5
75 kvartil, dage	24	27	26	24

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 44 dage, kemoterapi med 41 dage og strålebehandling med 45 dage.

Bilag 5 Dataopgørelser – kræft i tyk- og endetarm

Bilagstabel 5 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.
Kræft i tyk- og endetarm

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
2013															
Nordjylland	366	85	54	11	6	11	26	3,0	-	3,0	7,1	25,0	13	1	424
Midtjylland	569	84	93	12	12	16	53	2,1	2,1	2,8	9,3	164,2	22	1	1339
Syddanmark	873	87	116	20	25	25	46	2,3	2,9	2,9	5,3	29,7	10	1	449
Hovedstaden	954	77	217	27	58	46	86	2,8	6,1	4,8	9,0	40,1	11	1	1015
Sjælland	540	76	132	27	37	27	41	5,0	6,9	5,0	7,6	26,0	8	1	1014
Hele landet	3.302	81	612	97	138	125	252	2,9	4,2	3,8	7,6	52,6	11	1	1339
2014															
Nordjylland	495	76	120	18	21	30	51	3,6	4,2	6,1	10,3	23,8	12	1	635
Midtjylland	687	85	101	18	16	17	50	2,6	2,3	2,5	7,3	133,7	15	1	1365
Syddanmark	1.076	84	173	31	42	44	56	2,9	3,9	4,1	5,2	27,8	9	1	670
Hovedstaden	1.058	74	273	36	61	49	127	3,4	5,8	4,6	12,0	40,5	13	1	671
Sjælland	760	65	265	35	73	61	96	4,6	9,6	8,0	12,6	26,6	10	1	736

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gen-nemsnit	Median	Mini-maum	Maksi-mum
Hele landet	4.076	77	932	138	213	201	380	3,4	5,2	4,9	9,3	42,1	12	1	1365
2015															
Nordjylland	442	81	82	11	16	26	29	2,5	3,6	5,9	6,6	45,6	11	1	895
Midtjylland	798	85	119	23	20	31	45	2,9	2,5	3,9	5,6	44,0	12	1	481
Syddanmark	1.053	84	167	35	47	34	51	3,3	4,5	3,2	4,8	25,7	8	1	725
Hovedstaden	1.074	77	246	36	47	47	116	3,4	4,4	4,4	10,8	35,1	14	1	741
Sjælland	724	76	175	38	41	45	51	5,2	5,7	6,2	7,0	17,4	8	1	671
Hele landet	4.091	81	789	143	171	183	292	3,5	4,2	4,5	7,1	31,6	11	1	895
2016															
Nordjylland	453	77	104	12	22	28	42	2,6	4,9	6,2	9,3	25,2	12	1	396
Midtjylland	776	86	112	20	17	33	42	2,6	2,2	4,3	5,4	36,3	12	1	479
Syddanmark	1.019	86	141	30	30	25	56	2,9	2,9	2,5	5,5	19,5	11	1	179
Hovedstaden	847	83	140	27	25	37	51	3,2	3,0	4,4	6,0	19,7	11	1	185
Sjælland	732	73	198	35	41	54	68	4,8	5,6	7,4	9,3	16,7	12	1	213
Hele landet	3.827	82	695	124	135	177	259	3,2	3,5	4,6	6,8	22,3	12	1	479

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 37 dage, kemoterapi med 37 dage og strålebehandling med 41 dage.

Bilagstabel 6 Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF₄* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid** i dage, hele landet, 2013-2016
Kræft i tyk- og endetarm

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	4	4	4	4
50 kvartil, dage	11	12	11	12
75 kvartil, dage	26	25	23	21

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 37 dage, kemoterapi med 37 dage og strålebehandling med 41 dage.

Bilag 6 Dataopgørelser – hoved- og halskræft

Bilagstabel 7 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.
Hoved- og halskræft

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gen-nemsnit	Median	Mini-maum	Maksi-mum
2013															
Nordjylland	141	70	43	14	6	11	12	9,9	-	7,8	8,5	23,5	8	1	561
Midtjylland	288	59	118	20	21	30	47	6,9	7,3	10,4	16,3	70,7	13	1	1.243
Syddanmark	357	81	67	28	11	8	20	7,8	3,1	-	5,6	55,1	6	1	459
Hovedstaden	868	42	507	53	104	127	223	6,1	12,0	14,6	25,7	28,2	13	1	1.360
Sjælland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hele landet	1.655	55	738	115	142	176	305	6,9	8,6	10,6	18,4	39,1	12	1	1.426
2014															
Nordjylland	148	75	37	16	9	7	5	10,8	-	-	-	8,4	4	1	44
Midtjylland	277	70	82	31	11	20	20	11,2	4,0	7,2	7,2	39,6	7	1	686
Syddanmark	461	87	59	28	11	11	9	6,1	2,4	2,4	-	11,5	5	1	162
Hovedstaden	637	73	170	44	32	42	52	6,9	5,0	6,6	8,2	26,2	9	1	1.237
Sjælland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gen-nemsnit	Median	Mini-maum	Maksi-mum
Hele landet	1.523	77	348	119	63	80	86	7,8	4,1	5,3	5,6	25,0	7	1	1.237
2015															
Nordjylland	143	87	19	14	-	5	-	9,8	-	-	-	17,3	3	1	266
Midtjylland	270	72	75	29	11	17	18	10,7	4,1	6,3	6,7	13,9	6	1	210
Syddanmark	402	88	47	13	13	9	12	3,2	3,2	-	3,0	17,7	6	1	318
Hovedstaden	937	79	198	62	43	38	55	6,6	4,6	4,1	5,9	22,3	7	1	729
Sjælland	60	47	32	11	5	9	7	18,3	-	-	-	14,1	8	1	197
Hele landet	1.812	79	207	129	75	78	95	7,1	4,1	4,3	5,2	19,0	7	1	729
2016															
Nordjylland	166	93	11	6	-	-	5	-	-	-	-	11,6	12	1	33
Midtjylland	256	71	75	17	17	24	17	6,6	6,6	9,4	6,6	20,9	9	1	372
Syddanmark	377	85	55	24	18	13	-	6,4	4,8	3,4	-	6,6	4	1	51
Hovedstaden	858	84	141	23	31	28	59	2,7	3,6	3,3	6,9	45,2	12	1	538
Sjælland	109	50	55	23	11	11	10	21,1	10,1	10,1	-	8,7	5	1	51
Hele landet	1.766	80	345	93	77	80	95	5,3	4,4	4,5	5,4	26,1	8	1	538

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 28 dage, kemoterapi med 32 dage og strålebehandling med 32 dage.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ingen forløb angives med '-'.

Bilagstabel 8 Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF₄* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid** i dage, hele landet, 2013-2016
Hoved- og halskræft

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	5	2	1	2
50 kvartil, dage	12	7	7	8
75 kvartil, dage	23	14	15	16

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 28 dage, kemoterapi med 32 dage og strålebehandling med 32 dage.

Bilag 7 Dataopgørelser – blærekræft

Bilagstabel 9 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.
Blærekræft

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
2013															
Nordjylland	72	43	41	-	-	7	34	-	-	-	47,2	83,5	28	1	1049
Midtjylland	128	29	91	6	7	21	57	-	-	16,4	44,5	51,5	25	1	801
Syddanmark	107	24	81	9	6	15	51	-	-	14,0	47,7	49,0	21	1	559
Hovedstaden	458	64	165	15	12	29	109	3,3	2,6	6,3	23,8	51,8	24	1	883
Sjælland	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,0	37	15	360
Hele landet	773	50	385	30	25	75	255	3,9	3,2	9,7	33,0	55,4	24	1	1049
2014															
Nordjylland	80	50	40	-	-	-	40	-	-	-	50,0	67,8	51	1	325
Midtjylland	143	32	97	-	8	17	72	-	-	11,9	50,3	68,8	23	2	1129
Syddanmark	122	34	80	8	9	21	42	-	-	17,2	34,4	52,5	18	1	1005
Hovedstaden	246	50	123	10	14	23	76	-	5,7	9,3	30,9	37,0	18	1	419
Sjælland	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,6	30	12	89

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gen-nemsnit	Median	Mini-maum	Maksi-mum
Hele landet	601	40	360	25	35	65	235	4,2	5,8	10,8	39,1	53,5	23	1	1129
2015															
Nordjylland	87	38	54	-	6	-	48	-	-	-	55,2	66,9	34	1	789
Midtjylland	165	29	117	14	15	21	67	8,5	9,1	12,7	40,6	36,6	19	1	710
Syddanmark	107	42	62	6	7	13	36	-	-	12,1	33,6	37,2	19	1	252
Hovedstaden	201	51	98	14	13	28	43	7,0	6,5	13,9	21,4	25,4	13	1	278
Sjælland	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	14	2	66
Hele landet	573	41	340	40	40	65	195	7,0	7,0	11,3	34,0	38,7	19	1	789
2016															
Nordjylland	67	36	43	5	7	7	24	-	-	-	35,8	28,4	19	1	93
Midtjylland	169	44	95	10	12	21	52	-	7,1	12,4	30,8	31,8	17	1	411
Syddanmark	111	49	57	-	6	16	35	-	-	14,4	31,5	24,8	17	1	116
Hovedstaden	167	56	74	9	8	13	44	-	-	7,8	26,3	43,7	20	1	408
Sjælland	14	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	82,6	24	1	401
Hele landet	528	46	284	30	33	60	161	5,7	6,3	11,4	30,5	34,7	17	1	411

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 45 dage, kemoterapi med 48 dage og strålebehandling med 52 dage.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ingen forløb angives med '-'.

Bilagstabel 10 Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF4* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid** i dage, hele landet, 2013-2016
Blærekræft

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	11	11	7	7
50 kvartil, dage	24	23	19	17
75 kvartil, dage	49	48	38	34

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 45 dage, kemoterapi med 48 dage og strålebehandling med 52 dage

Bilag 8 Dataopgørelser – nyrekræft

Bilagstabel 11 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.
Nyrekræft

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
2013															
Nordjylland	79	54	36	-	-	-	36	-	-	-	45,6	89,5	52	1	904
Midtjylland	158	72	44	5	-	6	33	-	-	-	20,9	97,5	34	1	849
Syddanmark	167	65	59	8	9	11	31	-	-	6,6	18,6	58,0	18	1	897
Hovedstaden	227	51	112	5	10	24	73	-	-	10,6	32,2	79,0	25	1	1523
Sjælland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Hele landet	636	59	258	20	25	40	173	3,1	3,9	6,3	27,2	79,2	29	1	1523
2014															
Nordjylland	63	43	36	-	-	9	27	-	-	-	42,9	62,9	28	4	858
Midtjylland	251	66	85	9	7	17	52	-	-	6,8	20,7	68,5	21	1	683
Syddanmark	155	74	41	-	6	6	29	-	-	-	18,7	69,9	26	1	1037
Hovedstaden	247	62	94	11	9	16	58	4,5	-	6,5	23,5	54,8	23	1	1138
Sjælland	56	79	12	-	6	-	6	-	-	-	-	13,4	7	1	31

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gen-nemsnit	Median	Mini-maum	Maksi-mum
Hele landet	772	64	275	25	30	48	172	3,2	3,9	6,2	22,3	60,5	24	1	1138
2015															
Nordjylland	71	44	40	-	6	5	29	-	-	-	40,8	28,8	19	2	233
Midtjylland	230	58	96	12	8	16	60	5,2	-	7,0	26,1	51,8	22	1	980
Syddanmark	152	69	47	-	-	15	32	-	-	9,9	21,1	29,0	22	1	130
Hovedstaden	235	74	62	9	6	9	38	-	-	-	16,2	45,7	21	1	770
Sjælland	108	94	6	-	-	-	6	-	-	-	-	18,8	12	1	68
Hele landet	796	67	265	30	25	45	165	3,8	3,1	5,7	20,7	40,5	21	1	980
2016															
Nordjylland	76	66	26	-	-	7	19	-	-	-	25,0	25,8	18	1	162
Midtjylland	190	76	46	9	-	8	29	-	-	-	15,3	41,7	18	1	383
Syddanmark	176	64	64	8	7	12	37	-	-	6,8	21,0	38,7	23	1	598
Hovedstaden	183	90	18	-	-	5	13	-	-	-	7,1	55,5	17	1	543
Sjælland	119	96	5	-	-	-	5	-	-	-	-	25,8	20	4	66
Hele landet	744	75	183	25	20	35	103	3,4	2,7	4,7	13,8	38,9	18	1	598

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 45 dage og kemoterapi med 45 dage.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ingen forløb angives med '-'.

Bilagstabel 12 Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF4* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid** i dage, hele landet, 2013-2016
Nyrekræft

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	9	9	8	7
50 kvartil, dage	29	24	21	18
75 kvartil, dage	65	48	37	38

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 45 dage og kemoterapi med 45 dage

Bilag 9 Dataopgørelser – prostatakræft

Der skal være opmærksomhed på implementering af ny behandlingsform med opdeling i kirurgisk behandling og nervebesparende kirurgi med ny registreringspraksis til følge fra og med 1. januar 2014, hvilket har indflydelse på tallene. Den sidste behandlingsform blev defineret med væsentlig længere forløbstid end for kirurgisk behandling, se bilag 2.

Bilagstabel 13 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.
Prostatakræft

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
2013															
Nordjylland	154	18	126	-	7	9	110	-	-	-	71,4	137,9	63	1	1144
Midtjylland	315	43	178	14	16	34	114	4,4	5,1	10,8	36,2	111,2	32	1	1405
Syddanmark	221	39	135	8	13	21	93	-	5,9	9,5	42,1	90,1	31	1	809
Hovedstaden	616	31	422	26	33	46	317	4,2	5,4	7,5	51,5	63,3	34	1	918
Sjælland	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,3	57	2	557
Hele landet	1.318	34	864	50	69	110	635	3,8	5,2	8,3	48,2	88,9	37	1	1405
2014															
Nordjylland	154	19	125	-	5	9	111	-	-	-	72,1	106,8	58	2	919
Midtjylland	364	45	200	11	21	30	138	3,0	5,8	8,2	37,9	92,9	31	1	1093

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gen-nemsnit	Median	Mini-maum	Maksi-mum
Syddanmark	225	45	123	8	16	23	76	-	7,1	10,2	33,8	79,7	30	1	841
Hovedstaden	574	57	244	20	34	49	141	3,5	5,9	8,5	24,6	43,2	19	1	653
Sjælland	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	11	11	11
Hele landet	1.329	48	692	40	76	110	466	3,0	5,7	8,3	35,1	75,6	29	1	1093
2015															
Nordjylland	127	28	91	-	-	8	83	-	-	-	65,4	85,4	56	1	426
Midtjylland	425	51	209	16	28	28	137	3,8	6,6	6,6	32,2	80,9	27	1	732
Syddanmark	250	43	143	9	9	25	100	-	-	10,0	40,0	61,5	28	1	842
Hovedstaden	449	71	131	11	15	25	80	2,4	3,3	5,6	17,8	42,1	23	1	454
Sjælland	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	10	2	58
Hele landet	1.269	54	580	40	55	85	400	3,2	4,3	6,7	31,5	67,7	28	1	842
2016															
Nordjylland	120	30	84	-	8	6	70	-	-	-	58,3	50,1	40	1	241
Midtjylland	345	69	106	11	12	19	64	3,2	3,5	5,5	18,6	56,8	20	1	568
Syddanmark	217	43	123	5	17	17	84	-	7,8	7,8	38,7	42,4	26	1	404
Hovedstaden	401	64	144	12	13	44	75	3,0	3,2	11,0	18,7	34,9	18	1	464
Sjælland	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,3	15	10	54
Hele landet	1.097	58	465	30	50	90	295	2,7	4,6	8,2	26,9	44,7	25	1	568

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.
 **Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 50 dage, nervebesparende kirurgi 82 dage og strålebehandling med 55 dage.
 Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ingen forløb angives med '-'.

Bilagstabel 14 Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF4* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid** i dage, hele landet, 2013-2016
 Prostatakræft

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	13	11	11	10
50 kvartil, dage	37	29	28	25
75 kvartil, dage	78	69	62	50

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.
 **Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 50 dage, nervebesparende kirurgi 82 dage og strålebehandling med 55 dage

Bilag 10 Dataopgørelser – livmoderkræft

Bilagstabel 15 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.
Livmoderkræft

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
2013															
Nordjylland	93	60	37	9	14	6	8	-	15,1	-	-	10,4	6	1	48
Midtjylland	154	64	56	12	13	20	11	7,8	8,4	13,0	7,1	13,1	9	1	69
Syddanmark	151	70	45	6	11	10	18	-	7,3	-	11,9	15,6	11	1	90
Hovedstaden	311	71	90	17	22	27	24	5,5	7,1	8,7	7,7	12,4	10	1	63
Sjælland	84	61	33	6	10	8	9	-	-	-	-	33,9	8	2	676
Hele landet	793	67	261	50	70	71	70	6,3	8,8	9,0	8,8	15,5	9	3	676
2014															
Nordjylland	83	70	25	6	-	6	13	-	-	-	15,7	15,4	14	1	44
Midtjylland	164	64	59	16	20	17	6	9,8	12,2	10,4	-	7,8	6	1	30
Syddanmark	141	87	18	5	8	5	-	-	-	-	-	7,8	7	2	18
Hovedstaden	282	64	102	18	25	31	28	6,4	8,9	11,0	9,9	21,1	9	1	364
Sjælland	76	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	15,1	8	1	57

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gen-nemsnit	Median	Mini-maum	Maksi-mum
Hele landet	746	71	220	45	60	60	55	6,0	8,0	8,0	7,4	15,3	8	1	364
2015															
Nordjylland	60	72	17	-	5	7	5	-	-	-	-	14,0	10	1	52
Midtjylland	177	70	53	13	22	13	5	7,3	12,4	7,3	-	7,5	5	1	31
Syddanmark	169	86	24	6	7	5	6	-	-	-	-	10,8	7	1	38
Hovedstaden	166	67	54	7	18	10	19	-	10,8	-	11,4	14,6	10	1	93
Sjælland	101	74	26	7	9	10	-	-	-	-	-	20,8	7	1	362
Hele landet	673	73	181	35	61	45	40	5,2	9,1	6,7	5,9	12,9	6	1	362
2016															
Nordjylland	80	74	21	-	6	6	9	-	-	-	-	14,6	12	2	41
Midtjylland	172	83	30	8	17	5	-	-	9,9	-	-	6,1	5	1	18
Syddanmark	159	92	12	-	5	7	-	-	-	-	-	10,7	9	1	35
Hovedstaden	142	80	28	7	6	7	8	-	-	-	-	14,5	9	1	105
Sjælland	117	91	11	-	-	6	5	-	-	-	-	20,8	11	1	140
Hele landet	670	83	116	20	40	31	25	3,0	6,0	4,6	3,7	12,7	7	1	140

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 29 dage.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ingen forløb angives med '-'.

Bilagstabel 16 Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF₄* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid** i dage, hele landet, 2013-2016
Livmoderkræft

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	4	3	3	3
50 kvartil, dage	9	8	6	7
75 kvartil, dage	16	14	13	13

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 29 dage.

Bilag 11 Dataopgørelser – kræft i æggestok

Bilagstabel 17 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.
Kræft i æggestok

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
2013															
Nordjylland	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,8	7	2	353
Midtjylland	158	75	39	13	7	10	9	8,2	-	-	-	99,4	5	1	1541
Syddanmark	220	64	79	23	15	17	24	10,5	6,8	7,7	10,9	29,7	8	1	1105
Hovedstaden	291	58	123	32	29	32	30	11,0	10,0	11,0	10,3	13,9	8	1	124
Sjælland	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	7	1	29
Hele landet	785	67	260	70	60	65	65	8,9	7,6	8,3	8,3	32,3	8	1	1541
2014															
Nordjylland	95	82	17	6	6	-	5	-	-	-	-	12,6	5	2	65
Midtjylland	216	76	51	25	12	14	-	11,6	5,6	6,5	-	6,5	4	1	35
Syddanmark	198	76	48	20	6	13	9	10,1	0,0	6,6	-	9,0	6	1	36
Hovedstaden	153	53	72	22	14	15	21	14,4	9,2	9,8	13,7	34,0	7	1	557
Sjælland	27	-	6	-	-	6	-	-	-	-	-	121,6	11	1	1120

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gen-nemsnit	Median	Mini-maum	Maksi-mum
Hele landet	689	70	210	75	40	50	45	10,9	5,8	7,3	6,5	25,4	6	1	1120
2015															
Nordjylland	104	77	24	11	-	-	13	11	-	-	12,5	15,2	8	1	69
Midtjylland	201	87	27	8	13	-	6	-	6,5	-	-	27,9	4	1	469
Syddanmark	192	81	36	11	7	9	9	5,7	-	-	-	16,8	7	1	123
Hovedstaden	94	59	39	5	11	12	11	-	11,7	12,8	11,7	39,8	9	1	730
Sjælland	23	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	5,1	5	1	15
Hele landet	614	77	144	40	40	25	39	6,5	6,5	4,1	6,4	24,0	6	1	730
2016															
Nordjylland	104	83	18	6	7	-	5	-	-	-	-	12,4	5	1	99
Midtjylland	206	71	59	15	19	17	8	7,3	9,2	8,3	-	8,9	6	1	58
Syddanmark	200	85	31	10	11	5	5	-	5,5	-	-	8,4	5	1	55
Hovedstaden	117	64	42	10	12	9	11	-	10,3	-	9,4	15,3	6	1	88
Sjælland	35	49	18	5	6	-	7	-	-	-	-	11,1	8	1	35
Hele landet	662	73	177	46	55	40	36	6,9	8,3	6,0	5,4	11,1	6	1	99

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 24 dage og kemoterapi med 27 dage.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ingen forløb angives med '-'.

Bilagstabel 18 Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF₄* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid**
i dage, hele landet, 2013-2016
Kræft i æggestok

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	3	2	3	3
50 kvartil, dage	8	6	6	6
75 kvartil, dage	15	12	16	12

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.
Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 24 dage og kemoterapi med 27 dage.

Bilag 12 Dataopgørelser – modernærkekræft i hud

Bilagstabel 19 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.
Modernærkekræft i hud

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
2013															
Nordjylland	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2	1	2
Midtjylland	408	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	229,8	17	1	1085
Syddanmark	499	-	6	-	-	6	-	-	-	-	-	35,1	9	1	351
Hovedstaden	761	94	47	10	8	13	16	-	-	1,7	2,1	31,2	11	1	669
Sjælland	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	7	1	24
Hele landet	2.218	96	80	15	15	25	25	0,7	0,7	1,1	1,1	49,6	10	1	1085
2014															
Nordjylland	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,3	12	1	137
Midtjylland	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,8	9	1	739
Syddanmark	622	96	23	7	9	-	7	-	-	-	-	16,7	5	1	144
Hovedstaden	611	97	20	5	5	-	10	-	-	-	-	89,9	11	1	1160
Sjælland	307	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	46,5	12	1	499

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gen-nemsnit	Median	Mini-maum	Maksi-mum
Hele landet	2.419	97	75	15	20	15	25	0,6	0,8	0,6	1,0	56,9	9	1	1160
2015															
Nordjylland	489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,3	11	1	46
Midtjylland	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,0	4	1	543
Syddanmark	551	97	16	-	6	-	10	-	-	-	-	98,3	10	1	725
Hovedstaden	519	95	28	7	9	7	5	-	-	-	-	32,5	7	1	674
Sjælland	317	95	15	10	5	-	-	-	-	-	-	5,6	4	1	22
Hele landet	2.247	96	85	25	25	15	20	1,1	1,1	0,7	0,9	49,2	6	1	725
2016															
Nordjylland	565	98	12	-	-	5	7	-	-	-	-	34,4	10	1	234
Midtjylland	440	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	8,6	5	1	24
Syddanmark	667	96	26	9	5	6	6	-	-	-	-	10,3	7	1	42
Hovedstaden	605	93	40	10	12	11	7	-	2,0	1,8	-	20,4	6	1	351
Sjælland	405	96	15	5	-	5	5	-	-	-	-	10,6	10	1	37
Hele landet	2.682	96	120	35	25	30	30	1,3	0,9	1,1	1,1	17,1	7	1	351

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 31 dage.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ingen forløb angives med '-'.

Bilagstabel 20 Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF₄* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid**
i dage, hele landet, 2013-2016
Modermærkekræft i hud

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	3	3	2	2
50 kvartil, dage	10	12	6	7
75 kvartil, dage	16	25	12	14

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.
Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 31 dage.

Bilag 13 Dataopgørelser – lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Bilagstabel 21 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.
Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
2013															
Nordjylland	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,9	4	1	368
Midtjylland	176	93	13	5	-	-	8	-	-	-	-	99,1	12	1	754
Syddanmark	182	88	22	-	9	5	8	-	-	-	-	82,7	9	2	1470
Hovedstaden	314	89	35	5	5	11	14	-	-	3,5	4,5	24,0	12	2	256
Sjælland	162	-	6	-	-	6	-	-	-	-	-	16,1	12	3	53
Hele landet	917	88	110	20	20	30	40	2,2	2,2	3,3	4,4	51,2	11	1	1470
2014															
Nordjylland	76	86	11	-	5	-	6	-	-	-	-	23,7	10	1	96
Midtjylland	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	13	2	30
Syddanmark	183	91	16	5	-	5	6	-	-	-	-	80,0	9	2	1204
Hovedstaden	301	84	49	8	13	16	12	-	4,3	5,3	4,0	13,8	9	1	87
Sjælland	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	6	2	9

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gen-nemsnit	Median	Mini-maum	Maksi-mum
Hele landet	874	90	90	20	20	25	25	2,3	2,3	2,9	2,9	29,7	9	1	1204
2015															
Nordjylland	62	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	18,7	3	1	112
Midtjylland	213	-	10	-	5	-	5	-	-	-	-	42,1	7	2	416
Syddanmark	174	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	11,5	7	1	48
Hovedstaden	270	90	27	8	7	7	5	-	-	-	-	11,8	6	1	95
Sjælland	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	5	5	5
Hele landet	857	92	70	25	15	10	20	2,9	1,8	-	2,3	19,3	6	1	416
2016															
Nordjylland	93	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	19,4	14	1	52
Midtjylland	216	90	22	6	6	5	5	-	-	-	-	18,0	7	1	173
Syddanmark	224	87	29	-	7	6	16	-	-	-	7,1	36,2	14	1	530
Hovedstaden	234	84	37	7	12	12	6	-	5,1	5,1	-	8,7	6	1	25
Sjælland	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,7	11	4	185
Hele landet	908	87	115	20	30	30	35	2,2	3,3	3,3	3,9	21,5	10	1	530

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

** Anbefalede forløbstid angivet for kemoterapi med 31 dage og strålebehandling med 43 dage.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ingen forløb angives med '-'.

Bilagstabel 22 Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF₄* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid** i dage, hele landet, 2013-2016
Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	4	3	2	3
50 kvartil, dage	11	9	6	10
75 kvartil, dage	22	17	17	19

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.
Anbefalede forløbstid angivet for kemoterapi med 31 dage og strålebehandling med 43 dage.

Bilag 14 Dataopgørelser – kræft i bugspytkirtlen

Bilagstabel 23 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.
Kræft i bugspytkirtlen

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
2013															
Nordjylland	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	10	5	46
Midtjylland	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,6	7	4	494
Syddanmark	99	80	20	-	-	7	13	-	-	-	13,1	64,8	16	3	665
Hovedstaden	209	75	52	11	11	13	17	5,3	5,3	6,2	8,1	25,6	10	1	600
Sjælland	28	-	7	-	-	-	7	-	-	-	-	72,9	23	11	364
Hele landet	445	78	100	15	20	25	40	3,4	4,5	5,6	9,0	43,6	11	1	665
2014															
Nordjylland	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	10	7	11
Midtjylland	83	-	8	-	-	-	8	-	-	-	-	36,7	18	1	214
Syddanmark	144	76	34	5	7	11	11	-	-	7,6	7,6	22,8	11	1	332
Hovedstaden	122	80	25	-	8	-	17	-	-	-	13,9	35,1	16	1	209
Sjælland	37	65	13	-	-	5	8	-	-	-	-	26,0	18	4	90

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gen-nemsnit	Median	Mini-maum	Maksi-mum
Hele landet	432	77	99	10	20	25	44	-	4,6	5,8	10,2	28,7	14	1	332
2015															
Nordjylland	57	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	17,1	18	6	33
Midtjylland	72	-	8	-	-	-	8	-	-	-	-	62,8	32	1	239
Syddanmark	151	74	39	5	5	13	16	-	-	8,6	10,6	17,3	12	1	59
Hovedstaden	111	65	39	12	5	6	16	10,8	-	-	14,4	35,5	10	1	249
Sjælland	38	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	26,3	16	2	97
Hele landet	429	73	115	20	15	30	50	4,7	3,5	7,0	11,7	29,8	13	1	249
2016															
Nordjylland	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	16	1	22
Midtjylland	78	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	13,9	11	1	33
Syddanmark	146	67	48	6	12	15	15	-	8,2	10,3	10,3	21,8	10	1	185
Hovedstaden	69	-	7	-	-	-	7	-	-	-	-	24,1	15	3	101
Sjælland	24	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	10,9	6	4	40
Hele landet	375	76	90	15	20	25	30	4,0	5,3	6,7	8,0	19,4	11	1	185

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 43 dage, kemoterapi 44 dage og strålebehandling 48 dage.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ingen forløb angives med '-'.

Bilagstabel 24 Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF₄* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid**
i dage, hele landet, 2013-2016
Kræft i bugspytkirtlen

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	4	6	5	5
50 kvartil, dage	11	14	13	11
75 kvartil, dage	23	26	31	19

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 43 dage, kemoterapi 44 dage og strålebehandling 48 dage.

Bilag 15 Dataopgørelser – kræft i spiserøret, mavemunden eller mavesækken

Bilagstabel 25 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, fordelt efter sygehusregion, 2013-2016.
Kræft i spiserøret, mavemunden eller mavesækken

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
2013															
Nordjylland	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	16	1	31
Midtjylland	125	83	21	-	7	7	7	-	-	-	-	34,4	11	1	469
Syddanmark	136	87	18	-	-	8	10	-	-	-	-	21,7	11	1	122
Hovedstaden	214	70	64	8	9	22	25	-	-	10,3	11,7	27,0	12	1	223
Sjælland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hele landet	522	78	117	15	20	37	45	2,9	3,8	7,1	8,6	27,1	11	1	469
2014															
Nordjylland	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,7	14	2	61
Midtjylland	116	86	16	5	-	5	6	-	-	-	-	34,6	8	2	298
Syddanmark	174	93	12	7	5	-	-	-	-	-	-	25,4	6	1	350
Hovedstaden	116	70	35	8	5	11	11	-	-	9,5	9,5	25,8	11	1	229
Sjælland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gen-nemsnit	Median	Mini-maum	Maksi-mum
Hele landet	459	81	85	20	15	25	25	4,4	3,3	5,4	5,4	27,5	9	1	350
2015															
Nordjylland	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,0	34	9	59
Midtjylland	130	84	21	5	7	-	9	-	-	-	-	15,3	7	1	64
Syddanmark	168	93	11	-	-	5	6	-	-	-	-	20,7	13	3	55
Hovedstaden	160	74	41	6	6	12	17	-	-	7,5	10,6	21,2	12	1	130
Sjælland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hele landet	508	84	80	10	15	20	35	-	3,0	3,9	6,9	19,7	11	1	895
2016															
Nordjylland	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,8	11	2	104
Midtjylland	131	79	28	-	9	8	11	-	-	-	8,4	14,1	12	1	57
Syddanmark	189	84	31	7	10	8	6	-	-	-	-	18,0	7	1	173
Hovedstaden	146	74	38	5	14	8	11	-	9,6	-	7,5	18,9	8	1	169
Sjælland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hele landet	532	80	105	15	35	25	30	2,8	6,6	4,7	5,6	17,6	9	1	173

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 43 dage og kemoterapi med 51 dage.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ingen forløb angives med '-'.

Bilagstabel 26 Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF₄* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid** i dage, hele landet, 2013-2016
Kræft i spiserøret, mavemunden eller mavesækken

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	5	3	5	4
50 kvartil, dage	11	9	11	9
75 kvartil, dage	24	21	26	16

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.
Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 43 dage og kemoterapi med 51 dage.

I efterfølgende bilag vises alene tal for hele landet for, da volumen af data er lavt.
Ligeledes er der ej heller udarbejdet en nærmere beskrivelse af tallene.

Bilag 16 Dataopgørelser – kræft i galdegang

Bilagstabel 27 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, hele landet, 2013-2016.
Kræft i galdegang

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
2013	72	72	20	5	-	5	10	-	-	-	-	48,2	15	1	410
2014	84	76	20	-	-	5	15	-	-	-	17,9	91,7	36	1	1345
2015	100	75	25	-	5	5	15	-	-	-	15,0	26,3	18	2	105
2016	89	66	30	5	5	5	15	-	-	-	16,9	24,9	16	1	153

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 43 dage, kemoterapi med 44 dage og strålebehandling med 48 dage.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ingen forløb angives med '-'.

Bilagstabel 28 Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF₄* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid** i dage, hele landet, 2013-2016
Kræft i galdegang

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	7	10	6	7
50 kvartil, dage	15	36	18	16
75 kvartil, dage	30	73	28	26

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.
Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 43 dage, kemoterapi med 44 dage og strålebehandling med 48 dage.

Bilag 17 Dataopgørelser – primær leverkræft

Bilagstabel 29 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, hele landet, 2013-2016.
Primær leverkræft

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
2013	150	83	25	5	5	5	10	-	-	-	-	88,9	16	1	807
2014	140	82	25	5	-	5	15	-	-	-	10,7	103,4	29	1	1093
2015	125	76	30	5	-	5	20	-	-	-	16,0	48,7	24	1	434
2016	155	84	25	-	5	5	15	-	-	-	9,7	71,5	20	1	415

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 47 dage og kemoterapi med 48 dage.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ingen forløb angives med '-'.

Bilagstabel 30 Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF₄* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid** i dage, hele landet, 2013-2016
Primær leverkræft

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	5	9	14	7
50 kvartil, dage	16	29	24	20
75 kvartil, dage	30	14	43	62

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.
Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 47 dage og kemoterapi med 48 dage.

Bilag 18 Dataopgørelser – akut leukæmi / fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Bilagstabel 31 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, hele landet, 2013-2016.
Akut leukæmi / fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
2013	197	72	55	10	15	15	15	-	7,6	7,6	7,6	11,9	9	1	81
2014	171	65	60	20	10	20	10	11,7	-	11,7	-	9,3	8	1	49
2015	171	71	50	10	15	10	15	-	8,8	-	8,8	20,8	7	1	423
2016	119	62	45	10	10	10	15	-	-	-	12,6	13,6	9	1	58

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

** Anbefalede forløbstid angivet for kemoterapi med 6 dage.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ingen forløb angives med '-'.

Bilagstabel 32 Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF₄* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid** i dage, hele landet, 2013-2016
Akut leukæmi / fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	4	2	3	3
50 kvartil, dage	9	8	7	9
75 kvartil, dage	15	12	18	17

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.
Anbefalede forløbstid angivet for kemoterapi med 6 dage.

Bilag 19 Dataopgørelser – kræft i penis

Bilagstabel 33 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, hele landet, 2013-2016.
Kræft i penis

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
2013	74	70	22	-	5	5	12	-	-	-	16,2	34,1	15	2	263
2014	59	75	15	-	5	5	5	-	-	-	-	30,4	9	4	175
2015	77	61	30	5	10	5	10	-	-	-	-	45,4	13	1	497
2016	74	74	19	5	-	5	9	-	-	-	-	60,8	18	1	498

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 37 dage, kemoterapi med 38 dage og strålebehandling med 42 dage.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ingen forløb angives med '-'.

Bilagstabel 34 Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF₄* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid** i dage, hele landet, 2013-2016
Kræft i penis

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	5	4	4	8
50 kvartil, dage	15	9	13	18
75 kvartil, dage	34	48	29	53

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.
Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 37 dage, kemoterapi med 38 dage og strålebehandling med 42 dage.

Bilag 20 Dataopgørelser – kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Bilagstabel 35 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, hele landet, 2013-2016.
Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
2013	120	88	15	5	5	-	5	-	-	-	-	51,3	5	1	461
2014	96	-	10	-	5	-	5	-	-	-	-	21,9	17	1	62
2015	89	-	10	-	5	-	5	-	-	-	-	25,9	7	1	137
2016	98	-	10	5	-	-	5	-	-	-	-	31,8	14	3	143

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 36 dage og strålebehandling med 43 dage.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ingen forløb angives med '-'.

Bilagstabel 36 Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF4* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid** i dage, hele landet, 2013-2016
Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	3	4	1	3
50 kvartil, dage	5	17	7	14
75 kvartil, dage	8	33	31	22

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF4 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.
Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 36 dage og strålebehandling med 43 dage.

Bilag 21 Dataopgørelser – livmoderhalskræft

Bilagstabel 37 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, hele landet, 2013-2016.
Livmoderhalskræft

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
2013	267	64	95	20	30	25	20	7,5	11,2	9,4	7,5	11,2	7	1	100
2014	273	74	70	10	20	20	20	-	7,3	7,3	7,3	16,4	9	1	265
2015	218	77	50	10	10	10	20	-	-	-	9,2	25,6	12	1	215
2016	195	74	50	10	15	10	15	-	7,7	-	7,7	13,8	8	1	60

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

**Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 28 dage, kemoterapi med 31 dage og strålebehandling med 35 dage.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ingen forløb angives med '-'.

Bilagstabel 38 Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF₄* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid** i dage, hele landet, 2013-2016
Livmoderhalskræft

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	3	4	4	4
50 kvartil, dage	7	9	12	8
75 kvartil, dage	14	19	21	19

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.
Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 28 dage, kemoterapi med 31 dage og strålebehandling med 35 dage.

Bilag 22 Dataopgørelser – kræft i hjernen

Bilagstabel 39 Antal forløb OF₄*, andel forløb inden for anbefalede forløbstider**, antal og andel forløb OF₄ med anvendelse af flere dage end anbefalede forløbstid, gennemsnit og median i dage af tidsoverskridelse, minimum og maksimal anvendte antal dage ud over anbefalede forløbstid, hele landet, 2013-2016.
Kræft i hjernen

	Antal pakkeforløb i alt	Andel pakkeforløb inden for, procent	Antal pakkeforløb uden for	Antal pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet				Andel pakkeforløb med længere forløbstid end anbefalet, procent				Dage ud over anbefalede forløbstider			
				1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	1-3 dage	4-7 dage	8-15 dage	16+ dage	Gennemsnit	Median	Minimum	Maksimum
2013	355	87	45	10	10	10	15	-	-	-	4,2	93,0	8	1	1207
2014	363	92	30	10	5	5	10	-	-	-	-	97,0	10	1	1004
2015	389	88	45	20	5	5	15	5,1	-	-	3,9	37,9	6	1	599
2016	433	90	45	10	15	5	15	-	3,5	-	3,5	43,8	6	1	440

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.

** Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 22 dage.

Antal forløb fra 1-4 er maskeret med '-'. Andel maskeres med '-' ved antal forløb 0-10. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ingen forløb angives med '-'.

Bilagstabel 4o Antal anvendte dage for 25, 50 og 75 kvartil forløb OF₄* for forløb med anvendelse af flere dage anbefalede forløbstid** i dage, hele landet, 2013-2016
Kræft i hjernen

	2013	2014	2015	2016
25 kvartil, dage	3	3	1	3
50 kvartil, dage	8	10	6	6
75 kvartil, dage	26	23	19	20

Kilde: Landspatientregisteret 15. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *OF₄ 'samlet tid til behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start.
Anbefalede forløbstid angivet for kirurgisk behandling med 22 dage.

