



RAPPORT

2022

Nye kræfttilfælde i Danmark 2020

Cancerregisteret



**SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN**

Udgiver	Sundhedsdatastyrelsen Ørestads Boulevard 5 2300 København S
Ansvarlig institution	Sundhedsdatastyrelsen
Version	1.0
Versionsdato	20. december 2022
Web-adresse	www.sundhedsdata.dk
Titel	Nye kræfttilfælde i Danmark

Publikationen "Nye Kræfttilfælde i Danmark" fra Sundhedsdatastyrelsen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med statistik om sundhedsområdet, forskere, politikere og administratorer inden for stat, regioner og kommuner samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Rapporten kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Indhold

1.	Nye kræfttilfælde i 2020	4
1.1	45.205 nye kræfttilfælde i 2020	4
2.	Udvikling i nye kræfttilfælde for udvalgte diagnosegrupper	6
2.1	Hoved- og halskræft	7
2.2	Tyk- og endetarmskræft	8
2.3	Kræft i lunge, bronkier og luftrør	9
2.4	Modermærkekræft i hud og anden hudkræft	10
2.5	Prostatakræft	11
2.6	Testikelkræft	12
2.7	Brystkræft	13
2.8	Livmoderhals-, livmoder- og æggestokkræft	14
2.9	Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft	15
2.10	Hjerne- og centralnervesystem (neoplasi)	16
3.	Prævalens	17
3.1	Antal personer der lever med en kræftdiagnose i 2020	17
3.2	Udvikling i prævalensen 2011-2020	18
Bilag 1.	Efterregistreringer	20
Bilag 2.	Diagnosekoder for udvalgte grupper	21
Bilag 3.	Nye kræfttilfælde fordelt på udvalgte grupper	22
Bilag 4.	Nye kræfttilfælde fordelt på hovedgrupper efter ICD10	26
Bilag 5.	Nye kræfttilfælde og alder	30
Bilag 6.	Prævalens fordelt på køn og udvalgte grupper	32
Bilag 7.	Regionsfordeling	34
Bilag 8.	Primær lokalisation og køn	38

1. Nye kræfttilfælde i 2020

I denne rapport præsenteres tal fra Cancerregisteret for nye kræfttilfælde for 2020. Rapporten indeholder tal for udviklingen i antallet af nye tilfælde generelt og fordelt på udvalgte diagnosegrupper samt tal for prævalensen af kræft i den danske befolkning.

Derudover findes en række bilagstabeller, der viser mere detaljerede fordelinger på eksempelvis køn, aldersgrupper, region samt andre diagnosegrupperinger.

Beskrivelse af kilder og metode er tilgængelig på eSundhed under fanen *Information* via link: <https://www.esundhed.dk/Emner/Kraeft/Nye-kraefttilfaelde>

1.1 45.205 nye kræfttilfælde i 2020

I 2020 registreredes 45.205 nye kræfttilfælde, hvilket svarer til et fald på 0,6 pct. i antallet af registrerede tilfælde i forhold til 2019 (45.453) ved opgørelsestidspunktet for Cancerregisteret 2019 (november 2020). Efterfølgende er der registreret 143 nye tilfælde for 2019 (se Bilagstabel 1). Incidensen for 2020 vil stige, når de sidste registreringer for året løbende tilgår Cancerregisteret og sammenligninger mellem 2020 og tidligere år skal ses i lyset af dette. Resten af publikationens tal er baseret på den opdaterede version af Cancerregisteret for november 2021.

Faldet i antallet af nye kræfttilfælde afspejles også i den køns- og aldersstandardiserede incidensrate, som i 2020 var 635 (pr. 100.000 personer), hvilket er 2,8 pct. lavere end i 2019, hvor raten var 653 (se Tabel 1).

Tabel 1 Nye kræfttilfælde (samlet incidens) samt incidensrate (pr. 100.000 personer, alders- og kønsstandardiseret), 2011-2020


Årgang	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Samlet incidens (mænd og kvinder)	39 067	39 560	40 089	42 474	43 114	43 776	44 210	44 419	45 596	45 205
Incidensrate (alders- og kønsstandardiseret*)	640	637	636	660	658	660	652	645	653	635

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Til aldersstandardisering er benyttet tal for den danske befolkning år 2000 (DK-2000).

I 2020 blev der diagnosticeret 23.526 nye kræfttilfælde blandt mænd og 21.679 blandt kvinder. De seneste 10 år har incidensraten været forholdsvis stabil for begge køn og højere for mænd end kvinder (se Figur 1). I 2020 var den aldersstandardiserede incidensrate 693 for mænd og 595 for kvinder, svarende til et fald på henholdsvis 2,2 og 3,2 pct. i forhold til 2019.

Figur 1 Aldersstandardiseret* incidensrate (pr. 100.000 personer) fordelt på køn, 2011-2020



Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

Tekstboks 1: Aldersstandardiseret incidensrate

De fleste kræftsygdomme rammer i overvejende grad ældre personer. Derfor vil udviklingen i befolkningens alderssammensætning have indflydelse på det absolutte antal kræfttilfælde, hvilket kan vanskeliggøre sammenligning over tid. Der tages hensyn til ændringer i befolkningens alderssammensætning ved anvendelse af aldersstandardiserede incidensrater. I denne rapport angiver alle incidensrater antallet af nye kræfttilfælde pr. 100.000 mænd/kvinder aldersstandardiseret til den danske befolknings alderssammensætning i 2000 for at sikre sammenlignelige tal på tværs af år.

2. Udvikling i nye kræfttilfælde for udvalgte diagnosegrupper

I dette afsnit præsenteres udviklingen i nye kræfttilfælde for udvalgte diagnosegrupper. De specifikke diagnosekoder anvendt i inddelingen af alle grupperne fremgår af Bilagstabel 2.

I de kommende afsnit gennemgås hver af disse udvalgte grupper med figurer over udviklingen i aldersstandardiserede incidensrater de seneste ti år. De eksakte tal for antal nye tilfælde og incidensrater for mænd og kvinder findes i bilagstabellerne. For nogle af diagnosegrupperne har der været en stigning i de absolutte antal nye tilfælde, som ikke genfindes i incidensraterne, se tekstboks 1. Dette gælder eksempelvis for lungekræft.

Tekstboks 2: Diagnostisk aktivitet

Øget opmærksomhed og diagnostisk aktivitet kan medføre en stigning i hyppigheden af diagnosticerede kræfttilfælde over tid. Pakkeforløb for kræftsygdomme, øget screening og anvendelse af flere diagnostiske tests har indflydelse på både antallet af diagnosticerede kræftsygdomme, og hvornår i sygdomsforløbet diagnosen stilles. Når screeningsprogrammer startes, vil der initialt observeres en stigning i antallet af diagnosticerede kræfttilfælde og især af tilfælde diagnosticeret i sygdommens tidlige stadier. Da diagnosticeringen dermed er fremskyndet, vil antallet af fremskredne tilfælde falde i de efterfølgende år. En yderligere konsekvens af screening er, at der kan diagnosticeres tilfælde, der ikke nødvendigvis ville være blevet diagnosticeret før start af screenings-tilbuddet, hvilket naturligt påvirker incidensen.

Siden 2006 er alle danske kvinder i aldersgruppen 23-64 år blevet tilbudt screening for livmoderhalskræft. I årene frem til 2009 blev den diagnostiske aktivitet for prostatakkræft og brystkræft øget med henblik på tidlig opsporing og diagnose. Det indebar øget brug af PSA-måling, men ikke officiel (national) screening, samt udrulning af mammografiscreening til hele Danmark i 2007-2009 for aldersgruppen 50-69. I perioden 2014-2018 blev nationale screeningsprogrammer for tyk- og endetarmskræft implementeret for aldersgruppen 50-74 år, og tallene for nye tilfælde for disse kræftsygdomme skal ses i lyset af dette.


2.1 Hoved- og halskræft

Gruppen *hoved- og halskræft* dækker over kræft i læber, mundhule og svælg samt næsehule, mellemøre, bihuler, strubehoved og skjoldbruskkirtel (se Bilagstabel 2).

I 2020 blev der diagnosticeret henholdsvis 1.094 og 745 nye tilfælde af hoved- og halskræft hos mænd og kvinder (se Bilagstabel 3 og Bilagstabel 4).

Den aldersstandardiserede incidensrate for hoved- og halskræft hos mænd har ligget relativt stabilt i perioden 2011-2020 med mellem 32 og 34 nye tilfælde pr. 100.000 mænd pr. år (se Bilagstabel 5). For kvinder er incidensraten steget fra 18,7 til 22,5 pr. 100.000 kvinder i samme periode (se Bilagstabel 6).

Figur 2 Aldersstandardiseret* incidensrate for hoved- og halskræft (pr. 100.000 mænd/kvinder), 2011-2020



Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.


2.2 Tyk- og endetarmskræft

Stigningen i incidensen af tyk- og endetarmskræft i perioden omkring 2014 skal ses i lyset af indførelsen af nationale screeningsprogrammer, *jf.* tekstboks 2 side 6.

I 2020 ses et fald i antallet af nye tilfælde af tyktarmskræft blandt både kvinder og mænd sammenlignet med 2019. For kvinder er antallet af nydiagnosticerede tilfælde faldet fra 1.708 i 2019 til 1.591 i 2020 (se Bilagstabel 4). Incidensraten blandt kvinder er faldet med 8,0 pct. fra 44,8 i 2019 til 41,2 i 2020. For mænd er antallet af nye tilfælde i samme periode faldet fra 1.662 til 1.597, og incidensraten er faldet med 3,9 pct. fra 49,9 til 47,5 (se Bilagstabel 3 og Bilagstabel 5).

For kræft i endetarmen ses et fald i incidensraten for begge køn. For mænd er antallet af nye tilfælde faldet fra 888 i 2019 til 821 i 2020 og incidensraten er faldet med 7,4 pct. (se Bilagstabel 3 og Bilagstabel 5). For kvinder er antallet af nye tilfælde faldet fra 582 i 2019 til 521 i 2020, og incidensraten er faldet med 8,0 pct. (se Bilagstabel 4 og Bilagstabel 6).

Figur 3 Aldersstandardiseret* incidensrate for tyk- og endetarmskræft (pr. 100.000 mænd/kvinder), 2011-2020



Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.


I 2014 indførtes nationale screeningsprogrammer for tyk- og endetarmskræft.

2.3 Kræft i lunge, bronkier og luftrør

Der ses stort set samme antal nye tilfælde af lungekræft for begge køn i 2020 som i 2019. I 2020 var der 2.599 nye tilfælde blandt kvinder, mens der var 2.471 nye tilfælde blandt mænd. Den aldersstandardiserede incidensrate er 1,2 pct. og 1,3 pct. lavere for henholdsvis mænd og kvinder i 2020 sammenlignet med 2019.

For hele perioden 2011 til 2020 har udviklingen i den aldersstandardiserede incidensrate vist en først faldende og senere stagnerende tendens hos mænd og en overordnet stagnerende tendens hos kvinder (se Figur 4).

Figur 4 Aldersstandardiseret* incidensrate for lungekræft (pr. 100.000 mænd/kvinder), 2011-2020



Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.


Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

2.4 Modermærkekræft i hud og anden hudkræft

I de seneste år har incidensraten af modermærkekræft været stabil for begge køn (se Figur 5). Incidensraterne i 2020 er lidt lavere end i 2019. Fra 2019 til 2020 ses således et fald i incidensraten fra 41,6 til 40,8 hos mænd og fra 43,8 til 42,7 hos kvinder (se Bilagstabel 5 og Bilagstabel 6). Antallet af nye tilfælde i 2020 var henholdsvis 1.310 blandt mænd og 1.391 blandt kvinder (se Bilagstabel 3 og Bilagstabel 4).

For anden hudkræft er incidensraterne steget gennem hele perioden for både mænd og kvinder og i særdeleshed fra 2019 til 2020 (se Figur 5). I absolutte tal viser det sig ved, at henholdsvis 533 flere mænd og 470 flere kvinder blev diagnosticeret med anden hudkræft i 2020 sammenlignet med 2019 (se Bilagstabel 3 og Bilagstabel 4).

Figur 5 Aldersstandardiseret* incidensrate for henholdsvis modermærkekræft og anden hudkræft (pr. 100.000 mænd/kvinder), 2011-2020



Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.


Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

2.5 Prostatakræft

Den aldersstandardiserede incidensrate for prostatakræft har været faldende fra 149 pr. 100.000 mænd i 2011 til 124 pr. 100.000 mænd i 2020 (se Bilagstabel 5).

Fra 2019 til 2020 faldt antallet af nye tilfælde af prostatakræft med 56 fra 4.516 til 4.460 (se Bilagstabel 3). Incidensraten er faldet med 3,3 pct. fra 128,7 i 2019 til 124,5 i 2020.

Figur 6 Aldersstandardiseret* incidensrate for prostatakræft (pr. 100.000 mænd), 2011-2020



Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.


Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

2.6 Testikelkræft

I de seneste 10 år har den aldersstandardiserede incidensrate varieret mellem 10 og 13 nye tilfælde pr. 100.000 mænd pr. år (Figur 7). I samme periode har det laveste antal nye årlige tilfælde af testikelkræft været 285 i 2018 og det højeste 341 nye tilfælde i 2016 (se Bilagstabel 3).

Testikelkræft adskiller sig fra de øvrige kræftsygdomme ved at hovedparten af nye tilfælde diagnosticeres blandt de yngre aldersgrupper. I 2020 forekom omkring 70 pct. af alle nye tilfælde af testikelkræft blandt mænd yngre end 45 år, med 94 nye tilfælde i aldersgruppen 15-29 år og 134 nye tilfælde i aldersgruppen 30-44 år, se Bilagstabel 11.

Figur 7 Aldersstandardiseret* incidensrate for testikelkræft (pr. 100.000 mænd), 2011-2020



Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.


Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

2.7 Brystkræft

Incidensraten af brystkræft har ligget på et stabilt niveau fra 2011 til 2019, men faldt i 2020 til 140 fra 149 pr. 100.00 kvinder i 2019 (se Figur 8).

Denne udvikling ses også i antallet af nye brystkræfttilfælde, der er faldet fra 5.114 i 2019 til 4.857 i 2020 (se Bilagstabel 4). Det svarer til en 6,4 pct. lavere aldersstandardiseret incidensrate for 2020 sammenlignet med 2019.

Figur 8 Aldersstandardiseret* incidensrate for brystkræft (pr. 100.000 kvinder), 2011-2020



Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.


Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

2.8 Livmoderhals-, livmoder- og æggestokkræft

For hele perioden 2011-2020 ses en faldende tendens for den aldersstandardiserede incidensrate for både livmoder- og livmoderhalskræft. Det absolutte antal nye tilfælde af livmoderkræft ligger på omkring 800 nye tilfælde årligt, mens antallet af nye tilfælde af livmoderhalskræft varierer fra 426 i 2014 til 305 i 2020 (se Bilagstabel 4).

Kræft i æggestokkene inkluderer ud over kræft i æggestokkene også kræft i æggeledere og nærliggende bindevæv (se Bilagstabel 2). For æggestokkræft ses en stigning på 8,0 pct. i antallet af nye tilfælde fra 538 i 2019 til 581 nye tilfælde i 2020 (se Bilagstabel 4). Det svarer til en stigning i den aldersstandardiserede incidensrate fra 15 pr. 100.000 kvinder i 2019 til 16 i 2020 (se Figur 9 og Bilagstabel 6).

Figur 9 Aldersstandardiseret* incidensrate for livmoderhals-, livmoder- og æggestokkræft (pr. 100.000 kvinder), 2011-2020



Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.


2.9 Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft

Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft omfatter kræft i nyre, nyrebækken, urinleder og urinblære samt "urothelial carcinoma in situ" og andre ikke-invasive tumorer (neoplasier) i de fraførende urinveje (se Bilagstabel 2).

For både mænd og kvinder ses overordnet et fald i den aldersstandardiserede incidensrate de seneste 10 år (se Figur 10). I 2011 var incidensraten på henholdsvis 78,6 pr. 100.000 for mænd og 28,3 pr. 100.000 for kvinder, mens incidensraten i 2020 var 74,6 for mænd og 24,7 for kvinder.

Denne gruppe af kræftsygdomme og ikke-invasive tumorer (neoplasier) diagnosticeres således i højere grad blandt mænd end blandt kvinder. I 2020 var der 2.558 nye tilfælde af kræft og neoplasier i urinvejene blandt mænd og 937 nye tilfælde blandt kvinder (se Bilagstabel 3 og Bilagstabel 4).

Figur 10 Aldersstandardiseret* incidensrate for kræft i urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft (pr. 100.000 mænd/kvinder), 2011-2020



Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.


2.10 Hjerne- og centralnervesystem (neoplasi)

Gruppen svulster i *hjerne- og centralnervesystem* omfatter såvel kræft som andre tumorer (godartet neoplasi) (se Bilagstabel 2).

For både mænd og kvinder ses en let stigende tendens i den aldersstandardiserede incidensrate for svulster i hjerne- og centralnervesystem i perioden 2011-2020 (se Figur 11). Den højeste incidensrate er observeret i 2019 med et efterfølgende fald i 2020 til et niveau svarende til det for 2018. Fra 2019 til 2020 er incidensraten for mænd faldet fra 37,2 til 29,9 pr. 100.000 og for kvinder fra 48,5 til 41,2 pr. 100.000 (se Bilagstabel 5 og Bilagstabel 6).

Der ses flere nye tilfælde af denne gruppe af tumorer i hjerne- og centralnervesystem (kræft og godartede neoplasier) blandt kvinder end blandt mænd. I 2020 blev der diagnosticeret 1.343 nye tilfælde blandt kvinder og 965 nye tilfælde blandt mænd (se Bilagstabel 3 og Bilagstabel 4).

Figur 11 Aldersstandardiseret* incidensrate for kræft i hjerne- og centralnervesystem (neoplasi) (pr. 100.000 mænd/kvinder), 2011-2020



Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Incidensraten er antallet af nye tilfælde pr. 100.000 (mænd eller kvinder) aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000. Ved aldersstandardisering tages således hensyn til befolkningens aldersmæssige udvikling ved sammenligning af nye diagnosticerede tilfælde over årene.

3. Prævalens

3.1 Antal personer der lever med en kræftdiagnose i 2020

Ved udgangen af 2020 var der 362.715 personer, henholdsvis 198.663 kvinder og 164.052 mænd i Danmark, som levede med kræft eller som tidligere havde fået en kræftdiagnose (prævalente tilfælde). En person kan være registreret med flere anmeldelsespligtige kræftsygdomme i flere forskellige af de udvalgte diagnosegrupper. Såfremt personen har flere anmeldelsespligtige sygdomme inden for *samme diagnosegruppe*, tæller kun den først forekommende sygdom med i opgørelsen af prævalens.

Tabel 2 viser prævalente tilfælde i Danmark for mænd, fordelt på udvalgte grupper og alder. Den største gruppe blandt prævalente tilfælde udgøres hos mænd af prostatakraft med 45.600.

Tabel 2 Prævalens hos mænd fordelt på udvalgte grupper og alder, ultimo 2020*

Mænd	0-14 år	15-29 år	30-44 år	45-59 år	60-74 år	75+ år	Alle
Hoved og hals	5	68	310	1 765	4 201	2 404	8 753
Tyktarm	1-4	46	176	1 043	5 058	6 965	13 292
Endetarm	0	1-4	80	803	3 537	3 979	8 403
Lunge, bronkier og luftrør	0	9	40	580	2 905	2 716	6 253
Modermærkekraft i hud	5	127	1 101	3 479	5 485	5 040	15 237
Anden hudkraft**	1-4	18	101	762	3 965	10 169	15 016
Prostata	0	0	15	1 883	20 177	23 525	45 600
Testikel	16	430	2 128	3 710	2 508	638	9 430
Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekraft	46	88	349	2 217	8 651	10 190	21 541
Hjerne- og central-nervesystem	168	574	1 157	2 389	3 218	2 055	9 561
Anden kraft	451	1 137	1 858	5 384	12 313	10 444	31 587
Mænd i live (med tidligere kræftdiagnose)	700	2 485	7 184	23 069	65 041	65 576	164 052

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021 og CPR pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *For de udvalgte grupper er angivet antal prævalente tilfælde, mens sidste linje i tabellen angiver antal unikke prævalente personer. Tallene for de udvalgte grupper summerer derfor ikke nødvendigvis til "Mænd i live (med tidligere kræftdiagnose)".

**Ekskl. basalcelle hudkraft.

1-4 angiver, at tallet er diskretioneret, da der alene er 1-4 observationer i cellen. Kolonnen 'Alle' er som følge heraf afrundet til nærmeste 5 i de berørte rækker.

Tabel 3 viser prævalente tilfælde i Danmark for kvinder, fordelt på udvalgte grupper og alder. Den største gruppe blandt prævalente tilfælde udgøres af kvinder med brystkræft med 73.926 levende kvinder ultimo 2020.

Tabel 3 Prævalens hos kvinder fordelt på udvalgte grupper og alder, ultimo 2020*

Kvinder	0-14 år	15-29 år	30-44 år	45-59 år	60-74 år	75+ år	Alle
Hoved og hals	7	178	744	2 107	2 802	1 765	7 603
Tyktarm	1-4	70	189	1 145	4 675	8 158	14 241
Endetarm	0	8	67	655	2 300	2 916	5 946
Lunge, bronkier og luftrør	0	13	73	862	3 961	3 315	8 224
Modermærkekræft i hud	8	317	2 430	6 087	6 813	5 677	21 332
Anden hudkræft**	1-4	20	111	905	3 529	8 091	12 658
Bryst	0	64	1 971	13 907	30 900	27 084	73 926
Livmoderhals	0	58	1 228	2 812	2 810	2 037	8 945
Livmoder	0	1-4	84	1 066	4 541	5 919	11 614
Æggestok	7	71	179	887	2 059	1 706	4 909
Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft	33	66	169	903	3 411	4 154	8 736
Hjerne- og central-nervesystem	162	665	1 551	3 468	4 729	3 548	14 123
Anden kræft	332	937	1 539	4 554	10 115	9 826	27 303
Kvinder i live (med tidligere kræftdiagnose)	555	2 449	10 101	37 582	75 104	72 874	198 663

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021 og CPR pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *For de udvalgte grupper er angivet antal prævalente tilfælde, mens sidste linje i tabellen angiver antal unikke prævalente personer. Tallene for de udvalgte grupper summerer derfor ikke nødvendigvis til "Kvinder i live (med tidligere kræftdiagnose)".

**Ekskl. basalcelle hudkræft

1-4 angiver, at tallet er diskretioneret, da der alene er 1-4 observationer i cellen. 'Alle' er som følge heraf afrundet til nærmeste 5 i de berørte rækker.


Prævalensopgørelsen tager ikke hensyn til, hvornår kræftsygdommen er konstateret og således ikke, hvor længe personerne har overlevet siden diagnostetidspunktet. Oplysninger om overlevelse efter kræft kan findes i publikationen [Kræftoverlevelse i Danmark, 2006-2020](#).

3.2 Udvikling i prævalensen 2011-2020

Prævalensen kan benyttes til at vurdere omfanget af personer med behov for opfølgning og rehabilitering inden for den enkelte kræftsygdom.

Figur 12 viser udviklingen i prævalente tilfælde, sammenholdt med udviklingen i incidensen, i de seneste 10 år fordelt efter køn. Over hele perioden har der været en stigning i prævalensen for både mænd og kvinder.

Figur 12 Udviklingen i samlet prævalens og samlet incidens for mænd og kvinder, 2011-2020



Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021 og CPR pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Over hele perioden 2011-2020 er ratioen mellem prævalens og incidens steget for både mænd og kvinder, da stadig flere personer lever med kræft. Dette skyldes dels, at der over årene har været en stigning i antallet af diagnosticerede kræfttilfælde, men i høj grad også, at overlevelsen for en række kræftsygdomme gradvist er blevet forbedret. I 2020 var der 10.974 flere personer end i 2019, der levede med en kræftdiagnose, svarende til en stigning på 3,2 pct.

Udviklingen i prævalens de seneste 10 år fordelt efter køn og udvalgte diagnosegrupper fremgår af tabellerne i Bilag 6.

Bilag 1. Efterregistreringer

Bilagstabel 1 Nye kræfttilfælde tilført efter første offentliggørelse og årgangenes udgangsværdi

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nye tilfælde ved publikationsår	36 989	37 075	39 253	41 059	41 720	42 779	44 274	45 453	45 205
Nye tilfælde tilføjet siden publikation 2012	483								
Nye tilfælde tilføjet siden publikation 2013	312	771							
Nye tilfælde tilføjet siden publikation 2014	458	803	1 428						
Nye tilfælde tilføjet siden publikation 2015	960	1077	1 104	1 174					
Nye tilfælde tilføjet siden publikation 2016	283	138	343	527	854	0			
Nye tilfælde tilføjet siden publikation 2017	74	174	288	308	1 143	1327	0		
Nye tilfælde tilføjet siden publikation 2018	19	61	79	87	105	141	210	0	
Nye tilfælde tilføjet siden publikation 2019	-18	-10	-21	-41	-46	-37	-65	143	0
Total	39 578	40 099	42 495	43 155	43 822	44 247	44 484	45 453	45 205

Note: Bemærk at der fra 2016 er sket en ændring i de inkluderede grupper, der medtages i incidensberegningen for Cancerregisteret. Der er tilføjet seks diagnosegrupper i lymfatisk- og bloddannende væv. Ændringen er tilbageført til 2004 og medfører en stigning i den samlede årlige incidens. I 2016-2018 er der indhentet en større andel af de samlede kræfttilfælde direkte fra Patologiregisteret. Dette er sket som en konsekvens af manglende indberetninger fra flere regioner og kan være koblet til introduktionen af nye elektroniske patientjournaler (EPJ)-systemer. For visse kræftformers vedkommende kan manglende indberetning fra sygehusniveauet ikke suppleres via Patologiregisteret, da diagnosen verificeres uden vævsprøver, fx svulster i hjerne og centralnervesystem og leukæmier.

Bilag 2. Diagnosekoder for udvalgte grupper

Bilagstabel 2 ICD-10 gruppering af udvalgte grupper af kræftsygdomme

Anvendt klassifikation	ICD-10
Hoved-halskræft inkl. kræft i skjoldbruskkirtlen	C00-14, C30-32, C73
Tyktarmskræft inkl. overgang til endetarm	C18-19
Endetarmskræft	C20
Kræft i lunge, bronkier og luftrør	C33-34
Modermærkekræft i hud	C43
Anden hudkræft, ekskl. basalcelle hudkræft	C44
Brystkræft (kvinder)	C50
Livmoderhalskræft	C53
Livmoderkræft	C54-55
Kræft i æggestokkene inkl. kræft i æggeledere og nærliggende bindevæv	C56, C570-4
Prostatakræft	C61
Testikelkræft	C62
Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft	C64-68, D090-091, D095-096, D301-309, D411-419 Yderligere er D-koderne afgrænset ved morfologierne 812-813
Hjerne og centralnervesystem (neoplasi)	C70-72, C751-753, D32-33, D352-354, D42-43, D443, D444, D445

Bilag 3. Nye kræfttilfælde fordelt på udvalgte grupper

Bilagstabel 3 Nye kræfttilfælde for mænd fordelt på udvalgte grupper, 2011 - 2020

Mænd	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hoved og hals	972	1 002	1 003	983	1 015	1 074	1 070	1 063	1 069	1 094
Tyktarm	1 398	1 446	1 562	1 856	1 990	1 951	1 913	1 707	1 662	1 597
Endetarm	855	938	929	1 125	1 090	976	1 009	959	888	821
Lunge, bronkier og luftrør	2 297	2 393	2 265	2 443	2 337	2 366	2 434	2 402	2 408	2 471
Modermærkekræft i hud	1 041	1 059	974	1 090	1 033	1 221	1 255	1 357	1 321	1 310
Anden hudkræft*	1 218	1 229	1 412	1 472	1 690	1 810	1 844	2 066	2 035	2 568
Prostata	4 394	4 423	4 370	4 690	4 603	4 621	4 454	4 661	4 516	4 460
Testikel	294	328	286	293	289	341	285	285	340	323
Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft	2 222	2 258	2 329	2 485	2 413	2 435	2 551	2 380	2 555	2 558
Hjerne og centralnervesystem	749	850	729	824	881	979	836	944	1 167	965
Øvrige	4 542	4 662	4 755	4 970	5 056	5 078	5 338	5 328	5 627	5 359
Total	19 982	20 588	20 614	22 231	22 397	22 852	22 989	23 152	23 588	23 526

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

Bilagstabel 4 Nye kræfttilfælde for kvinder fordelt på udvalgte grupper, 2011 - 2020

Kvinder	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hoved og hals	576	579	609	626	618	687	702	699	736	745
Tyktarm	1 533	1 542	1 487	1 807	1 874	1 793	1 809	1 616	1 708	1 591
Endetarm	606	572	562	692	698	590	639	587	582	521
Lunge, bronkier og luftrør	2 229	2 221	2 323	2 277	2 361	2 384	2 434	2 505	2 516	2 599
Modermærkekræft i hud	1 220	1 138	1 176	1 288	1 269	1 390	1 256	1 445	1 422	1 391
Anden hudkræft*	994	963	1 084	1 091	1 225	1 331	1 383	1 576	1 548	2 018
Bryst	4 750	4 659	4 848	4 851	4 828	4 868	4 894	4 995	5 114	4 857
Livmoderhals	406	367	372	426	363	343	372	333	356	305
Livmoder	804	803	844	813	849	821	806	796	835	822
Æggestok	572	568	551	504	537	550	546	542	538	581
Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft	923	938	915	983	1 036	982	987	1 012	940	937
Hjerne og centralnervesystem	874	982	878	974	1 092	1 258	1 191	1 253	1 582	1 343
Øvrige	3 598	3 640	3 826	3 911	3 967	3 927	4 202	3 908	4 131	3 969
Total	19 085	18 972	19 475	20 243	20 717	20 924	21 221	21 267	22 008	21 679

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

Bilagstabel 5 Aldersstandardiseret incidensrate for mænd (pr. 100.000 mænd)
fordelt på udvalgte grupper, 2011 - 2020

Mænd	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hoved og hals	32,7	33,1	32,8	31,7	32,4	33,8	33,0	32,2	32,0	32,1
Tyktarm	50,3	51,6	54,8	62,4	63,6	61,9	58,4	52,3	49,9	47,5
Endetarm	29,9	32,4	31,2	36,9	34,6	30,6	30,9	29,0	26,4	24,4
Lunge, bronkier og luftrør	81,0	82,5	76,5	79,8	75,4	73,6	74,0	71,3	70,0	70,8
Modermærkekræft i hud	37,2	37,1	33,6	36,6	34,4	40,3	40,4	42,9	41,6	40,8
Anden hudkræft*	48,3	47,8	53,4	54,5	60,5	62,9	62,0	68,2	64,6	78,2
Prostata	149,5	146,8	142,2	147,1	142,5	140,1	133,0	135,3	128,7	124,5
Testikel	11,3	12,8	11,2	11,4	10,9	13,1	10,7	10,7	12,6	12,0
Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft	78,6	79,0	78,9	82,1	79,4	77,2	79,1	72,6	76,0	74,6
Hjerne og centralnervesystem	26,1	29,6	25,3	28,0	29,2	32,4	26,9	30,4	37,2	29,9
Øvrige	161,8	162,5	162,2	166,5	166,4	162,5	168,0	163,9	169,4	157,8
Total	706,5	715,1	702,0	736,8	729,2	728,3	716,4	708,5	708,4	692,5

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

Bilagstabel 6 Aldersstandardiseret incidensrate for kvinder (pr. 100.000 kvinder)
fordelt på udvalgte grupper, 2011 - 2020

Kvinder	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hoved og hals	18,7	18,6	19,4	19,8	19,3	21,5	21,7	21,0	22,2	22,5
Tyktarm	46,0	45,7	43,3	51,4	52,3	49,3	48,6	43,1	44,8	41,2
Endetarm	18,3	17,0	16,6	20,1	20,1	16,5	17,9	16,2	15,9	13,8
Lunge, bronkier og luftrør	68,0	66,5	68,5	65,3	66,4	65,9	65,7	66,5	65,2	66,1
Modermærkekræft i hud	41,0	37,8	39,1	42,1	41,1	44,5	39,3	45,1	43,8	42,7
Anden hudkræft*	28,7	26,9	30,2	29,5	32,7	35,0	35,6	40,3	38,7	49,4
Bryst	148,7	145,3	149,2	148,6	145,4	147,2	145,7	146,8	149,2	139,6
Livmoderhals	14,7	13,1	13,3	15,4	12,7	12,1	13,0	11,5	12,3	10,5
Livmoder	24,7	24,2	25,1	23,6	24,2	23,4	22,6	21,7	22,7	21,9
Æggestok	18,1	17,4	16,6	14,9	15,8	15,9	15,7	15,0	14,9	16,0
Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft	28,3	28,1	26,9	28,3	29,4	28,0	27,1	27,4	24,9	24,7
Hjerne og centralnervesystem	28,9	31,9	28,3	31,0	34,2	40,1	36,7	38,4	48,5	41,2
Øvrige	110,4	110,4	114,1	114,9	114,0	112,0	117,4	107,0	111,6	105,2
Total	594,4	582,7	590,5	605,0	607,3	611,3	607,1	599,9	614,8	594,8

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

Bilag 4. Nye kræfttilfælde fordelt på hovedgrupper efter ICD10

Bilagstabel 7 Antal nye kræfttilfælde (incidens) i 2019 og 2020 fordelt på hovedgrupper efter ICD10

Hovedgruppe	2019			2020		
	Mænd	Kvinder	I alt	Mænd	Kvinder	I alt
Mundhule og svælg	672	320	992	748	320	1 068
Fordøjelsesorganer	4 717	3 702	8 419	4 557	3 557	8 114
Luftveje og respirationsorganer	2 817	2 651	5 468	2 814	2 725	5 539
Knogler og ledbrusk	53	38	91	29	23	52
Hud*	3 356	2 970	6 326	3 878	3 409	7 287
Mesoteliom og bindevæv	148	122	270	131	147	278
Bryst	54	5 114	5 168	43	4 857	4 900
Kvindelige kønsorganer	0	1 861	1 861	0	1 863	1 863
Mandlige kønsorganer	4 928	0	4 928	4 852	0	4 852
Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft	2 555	940	3 495	2 558	937	3 495
Hjerne, centralnervesystem og øje	1 216	1 644	2 860	1 027	1 380	2 407
Endokrine kirtler	166	348	514	158	366	524
Lymfatisk væv	1 587	1 342	2 929	1 511	1 270	2 781
Bloddannende væv	1 082	720	1 802	1 004	609	1 613
Anden og dårligt specificeret kræft	237	236	473	216	216	432
Total	23 588	22 008	45 596	23 526	21 679	45 205

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

Beskrivelse af diagnoseinddelingen er tilgængelig på eSundhed under 'Dokumentation' via link:
<https://www.esundhed.dk/Emner/Kraeft/Nye-kræfttilfaelde>

Bilagstabel 8 Antal nye kræfttilfælde (incidens) for basalcelle hudkræft og carcinoma in situ i bryst i 2019 og 2020

Gruppe	2019			2020		
	Mænd	Kvinder	I alt	Mænd	Kvinder	I alt
Basalcelle hudkræft	7 006	7 676	14 682	6 781	7 324	14 105
Carcinoma in situ i bryst	1-4	528	531	1-4	486	488
Total (inkl. incidensen, Bilagstabel 7)	30 597	30 212	60 809	30 309	29 489	59 798

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: 1-4 angiver, at tallet er diskretioneret, da der alene er 1-4 observationer i cellen. Totaler og 'I alt' er som følge heraf afrundede til nærmeste 5 i de berørte kolonner og rækker.

Bilagstabel 9 Aldersstandardiseret incidensrate (pr. 100.000 personer) i 2019 og 2020 fordelt på hovedgrupper efter ICD-10 gruppering

Hovedgruppe	2019		2020	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder
Mundhule og svælg	19,8	8,8	21,7	8,7
Fordøjelsesorganer	140,0	98,1	133,7	92,5
Luftveje og respirationsorganer	82,1	68,9	80,7	69,5
Knogler og ledbrusk	1,8	1,2	0,9	0,7
Hud*	106,2	82,5	119,0	92,1
Mesoteliom og bindevæv	4,8	3,4	4,0	4,2
Bryst	1,6	149,2	1,4	139,6
Kvindelige kønsorganer	0,0	53,5	0,0	52,4
Mandlige kønsorganer	143,4	0,0	138,5	0,0
Urinveje (neoplasi) inkl. Nyrekræft	76,0	24,9	74,6	24,7
Hjerne, centralnervesystem og øje	38,7	50,4	31,8	42,2
Endokrine kirtler	5,4	11,7	5,1	12,2
Lymfatisk væv	48,0	36,8	44,8	34,2
Bloddannende væv	33,3	19,4	29,9	16,3
Anden og dårligt specificeret kræft	7,3	6,1	6,5	5,4
Total	708,4	614,8	692,5	594,8

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

Beskrivelse af diagnoseinddelingen er tilgængelig på eSundhed under 'Dokumentation' via link:
<https://www.esundhed.dk/Emner/Kraeft/Nye-kraefttilfaelde>

Bilagstabel 10 Aldersstandardiseret incidensrate (pr. 100.000 personer) inklusive basalcelle hudkræft og carcinoma in situ i bryst i 2019 og 2020

Hovedgruppe	2019		2020	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder
Basalcelle hudkræft	213,2	214,3	201,7	201,7
Carcinoma in situ i bryst	0,1	16,1	0,1	14,5
Total (inkl. incidensen, Bilagstabel 9)	921,6	845,2	894,3	811,1

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Bilag 5. Nye kræfttilfælde og alder

Bilagstabel 11 Antal nye tilfælde for udvalgte kræftformer for mænd fordelt på alder, 2020

Mænd	0-14	15-29	30-44	45-59	60-74	75+	Total
Hoved og hals	1-4	7	45	269	572	199	1 094
Tyktarm	1-4	15	40	162	665	713	1 597
Endetarm	0	1-4	20	125	377	296	821
Lunge, bronkier og luftrør	1-4	1-4	14	269	1 194	991	2 471
Modermærkekræft i hud	1-4	20	107	336	465	381	1 310
Anden hudkræft*	0	1-4	17	133	787	1 627	2 568
Prostata	0	0	5	396	2 508	1 551	4 460
Testikel	1-4	94	134	62	25	6	323
Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft	5	9	55	329	1 149	1 011	2 558
Hjerne og centralnervesystem	33	58	83	215	352	224	965
Øvrige	44	79	148	727	2 340	2 021	5 359
Total	90	291	668	3 023	10 434	9 020	23 526

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

1-4 angiver, at tallet er diskretioneret, da der alene er 1-4 observationer i cellen. Totaler og 'Ialt' er som følge heraf afrundede til nærmeste 5 i de berørte kolonner og rækker.

Bilagstabel 12 Antal nye tilfælde for udvalgte kræftformer for kvinder fordelt på alder, 2020

Kvinder	0-14	15-29	30-44	45-59	60-74	75+	Total
Hoved og hals	1-4	40	90	215	254	144	745
Tyktarm	1-4	21	45	180	581	761	1 591
Endetarm	0	1-4	6	104	205	204	521
Lunge, bronkier og luftrør	0	1-4	23	297	1 321	955	2 599
Modermærkekræft i hud	0	46	219	407	413	306	1 391
Anden hudkræft*	0	1-4	14	161	632	1 209	2 018
Bryst	0	24	382	1 363	1 786	1 302	4 857
Livmoderhals	0	18	109	77	68	33	305
Livmoder	0	0	19	168	386	249	822
Æggestok	1-4	17	18	131	221	191	581
Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft	1-4	5	23	140	392	375	937
Hjerne og centralnervesystem	35	84	195	337	402	290	1 343
Øvrige	35	83	142	560	1 553	1 596	3 969
Total	80	345	1 285	4 140	8 214	7 615	21 679

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

1-4 angiver, at tallet er diskretioneret, da der alene er 1-4 observationer i cellen. Totaler og 'Ialt' er som følge heraf afrundede til nærmeste 5 i de berørte kolonner og rækker.

Bilag 6. Prævalens fordelt på køn og udvalgte grupper

Bilagstabel 13 Prævalens hos mænd fordelt på udvalgte grupper, 2011-2020

Mænd	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hoved og hals	6 485	6 717	6 988	7 240	7 463	7 760	8 032	8 283	8 480	8 753
Tyktarm	8 263	8 641	9 113	9 815	10 706	11 520	12 212	12 632	13 036	13 292
Endetarm	5 726	6 033	6 322	6 869	7 308	7 602	7 928	8 167	8 335	8 403
Lunge, bronkier og luftrør	3 932	4 155	4 292	4 525	4 700	4 993	5 319	5 679	5 993	6 253
Modermærkekræft i hud	8 838	9 485	10 065	10 729	11 338	12 120	12 911	13 730	14 472	15 237
Anden hudkræft*	8 102	8 500	9 061	9 698	10 392	11 244	12 030	12 906	13 728	15 016
Prostata	27 032	29 331	31 459	33 972	36 224	38 435	40 347	42 349	44 128	45 600
Testikel	7 976	8 167	8 303	8 456	8 613	8 817	8 955	9 092	9 273	9 430
Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft	15 283	15 946	16 648	17 450	18 194	18 830	19 677	20 223	20 936	21 541
Hjerne og centralnervesystem	5 989	6 394	6 681	7 052	7 439	7 896	8 230	8 601	9 204	9 561
Anden kræft	20 006	21 130	22 369	23 780	25 067	26 386	27 797	29 119	30 486	31 587
Mænd i live (med tidligere kræftdiagnose)	108 612	114 548	120 400	127 485	133 993	140 860	147 067	152 904	158 827	164 052

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021 og CPR pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

Bilagstabel 14 Prævalens hos kvinder fordelt på udvalgte grupper, 2011-2020

Kvinder	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hoved og hals	4 901	5 114	5 367	5 679	5 934	6 284	6 590	6 907	7 261	7 603
Tyktarm	9 869	10 269	10 621	11 313	12 008	12 544	13 136	13 434	13 883	14 241
Endetarm	4 359	4 518	4 662	4 971	5 232	5 388	5 627	5 783	5 891	5 946
Lunge, bronkier og luftrør	4 391	4 696	5 102	5 423	5 800	6 231	6 717	7 293	7 762	8 224
Modermærkekræft i hud	13 464	14 192	14 965	15 869	16 744	17 728	18 543	19 507	20 459	21 332
Anden hudkræft*	6 585	6 998	7 499	8 033	8 614	9 272	9 929	10 733	11 484	12 658
Bryst	56 752	58 674	60 664	62 611	64 573	66 544	68 360	70 205	72 216	73 926
Livmoderhals	8 936	8 893	8 870	8 936	8 960	8 931	8 957	8 950	8 965	8 945
Livmoder	10 274	10 466	10 658	10 837	11 006	11 105	11 239	11 353	11 502	11 614
Æggestok	4 502	4 538	4 582	4 619	4 671	4 694	4 777	4 806	4 867	4 909
Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft	6 198	6 426	6 689	7 018	7 398	7 657	7 963	8 267	8 541	8 736
Hjerne og central-nervesystem	8 389	8 892	9 307	9 810	10 432	11 139	11 794	12 428	13 404	14 123
Anden kræft	18 022	18 828	19 893	20 960	22 068	23 139	24 430	25 294	26 352	27 303
Kvinder i live (med tidligere kræftdiag-nose)	145 613	150 612	156 150	162 337	168 420	174 548	180 742	186 593	192 914	198 663

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021 og CPR pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

Bilag 7. Regionsfordeling

Bilagstabel 15 Antal nye tilfælde for mænd fordelt på udvalgte grupper og region, 2020

Mænd	Region Nordjylland	Region Midtjylland	Region Syddanmark	Region Hovedstaden	Region Sjælland
Hoved og hals	130	250	228	299	187
Tyktarm	176	335	343	464	279
Endetarm	92	188	187	208	146
Lunge, bronkier og lufrør	317	560	564	583	447
Modermærkekræft i hud	108	282	303	429	188
Anden hudkræft*	262	522	726	643	415
Prostata	512	1 185	1 019	1 092	652
Testikel	36	86	54	105	42
Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft	283	636	551	685	403
Hjerne og centralnervesystem	113	241	222	261	128
Øvrige	598	1 153	1 274	1 493	841
Total	2 627	5 438	5 471	6 262	3 728

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

Bilagstabel 16 Aldersstandardiseret incidensrate for mænd (pr. 100.000 mænd)
fordelt på udvalgte grupper og region, 2020

Mænd	Region Nordjylland	Region Midtjylland	Region Syddanmark	Region Hovedstaden	Region Sjælland
Hoved og hals	35,9	33,0	29,4	31,4	33,9
Tyktarm	45,3	44,0	45,2	50,9	51,4
Endetarms	24,6	24,7	24,1	22,9	27,2
Lunge, bronkier og luftrør	81,9	71,1	70,8	62,0	77,5
Modermærkekræft i hud	30,6	39,2	43,2	47,3	36,0
Anden hudkræft *	68,5	71,6	93,4	75,3	77,2
Prostata	127,7	146,7	124,0	113,0	111,0
Testikel	13,2	14,2	9,7	11,6	11,4
Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft	73,3	82,3	70,6	74,0	72,0
Hjerne og centralnervesystem	32,3	33,4	31,0	28,0	26,2
Øvrige	158,0	152,0	164,5	160,6	151,8
Total	691,4	712,1	705,8	676,9	675,5

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

Bilagstabel 17 Antal nye tilfælde for kvinder fordelt på udvalgte grupper og region, 2020

Kvinder	Region Nordjylland	Region Midtjylland	Region Syddanmark	Region Hovedstaden	Region Sjælland
Hoved og hals	109	201	152	186	97
Tyktarm	165	340	377	438	271
Endetarm	56	123	126	123	93
Lunge, bronkier og luftrør	319	553	574	691	462
Modermærkekræft i hud	132	327	289	447	196
Anden hudkræft *	190	377	620	526	305
Bryst	479	1 047	1 104	1 450	777
Livmoderhals	30	61	85	77	52
Livmoder	91	162	182	231	156
Æggestok	65	100	141	169	106
Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft	108	222	195	261	151
Hjerne og centralnervesystem	125	299	323	397	199
Øvrige	428	857	907	1 154	623
Total	2 297	4 669	5 075	6 150	3 488

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

Bilagstabel 18 Aldersstandardiseret incidensrate for kvinder (pr. 100.000 kvinder)
fordelt på udvalgte grupper og region, 2020

Kvinder	Region Nordjylland	Region Midtjylland	Region Syddanmark	Region Hovedstaden	Region Sjælland
Hoved og hals	30,7	27,9	21,8	18,4	18,1
Tyktarm	39,7	39,7	43,7	39,1	44,4
Endetarm	14,2	14,8	15,2	11,2	15,5
Lunge, bronkier og luftrør	75,1	63,7	65,9	61,2	72,4
Modermærkekræft i hud	37,1	45,2	43,5	44,4	38,0
Anden hudkræft *	43,5	42,3	67,6	44,3	46,6
Bryst	128,9	136,3	145,4	141,0	141,7
Livmoderhals	10,7	9,8	13,7	8,2	13,4
Livmoder	22,5	19,1	22,1	21,1	26,2
Æggestok	17,1	12,4	17,7	15,9	18,5
Urinveje (neoplasi) inkl. nyrekræft	26,1	26,7	23,2	23,6	25,2
Hjerne og centralnervesystem	35,9	41,2	45,8	39,6	44,5
Øvrige	106,8	103,2	107,8	105,7	102,4
Total	588,4	582,3	633,4	573,5	607,0

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft.

Bilag 8. Primær lokalisation og køn

Bilagstabel 19 Incidens fordelt på primær lokalisation for mænd (M) og kvinder (K),
2011-2020

	Køn	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Læbe	M	20	26	14	8	14	9	6	9	13	17
	K	10	6	11	9	7	12	6	9	10	8
Tunge	M	127	117	119	101	119	104	112	116	162	163
	K	54	59	59	47	51	48	49	66	78	79
Mundhule	M	125	138	160	153	160	156	166	143	146	165
	K	85	105	97	89	93	102	90	104	85	94
Spytkirtel	M	25	39	33	35	33	56	35	38	36	41
	K	28	25	26	30	37	31	38	35	37	28
Tonsil og mundsvælg	M	251	240	232	255	242	289	277	265	214	265
	K	69	90	102	88	94	87	105	107	86	83
Næsesvælg	M	17	24	22	10	12	17	12	21	12	13
	K	7	7	8	8	5	8	6	10	7	9
Andre dele af svælg	M	88	79	91	81	89	92	79	85	89	82
	K	28	17	22	24	14	17	13	21	15	16
Anden og dårligt specificeret lokalisation i læbe, mundhule og svælg	M	1-4	1-4	1-4	1-4	0	1-4	1-4	5	0	1-4
	K	1-4	0	0	1-4	0	1-4	0	1-4	1-4	1-4
Spiserør	M	372	422	389	350	409	384	417	477	432	390
	K	134	145	121	151	126	165	148	155	161	152
Mavesæk	M	360	337	338	427	404	412	435	472	497	505
	K	201	190	175	193	219	224	234	197	216	222
Tyndtarm	M	75	93	89	81	88	110	132	141	125	136
	K	65	64	65	64	75	87	110	103	109	110
Tyktarm (inkl. colon-rectosigmoideum)	M	1 398	1 446	1 562	1 856	1 990	1 951	1 913	1 707	1 662	1 597
	K	1 533	1 542	1 487	1 807	1 874	1 793	1 809	1 616	1 708	1 591
Endetarm	M	855	938	929	1 125	1 090	976	1 009	959	888	821
	K	606	572	562	692	698	590	639	587	582	521
Endetarmsåbning	M	45	44	36	44	35	53	47	41	37	60
	K	98	102	115	103	94	91	105	114	98	113
Lever	M	288	271	295	319	303	344	321	380	364	332
	K	106	130	110	141	115	141	131	171	154	153
Galdeblære og galdeveje	M	97	87	84	101	101	92	111	88	115	95
	K	127	138	102	117	129	103	124	118	133	138

Bugspytkirtel	M	513	517	460	493	508	511	574	560	590	612
	K	468	468	501	475	463	444	543	565	530	548
Anden og dårligt specificeret lokalisation i fordøjelsesorganer	M	8	5	5	12	1-4	1-4	7	1-4	7	9
	K	7	9	11	5	9	8	11	1-4	11	9
Næsehule, mellemøre og bihuler	M	35	42	26	36	44	42	46	43	44	34
	K	29	31	22	23	26	32	36	24	32	29
Strubehoved	M	213	211	214	199	192	187	204	201	197	166
	K	62	39	57	49	36	51	47	41	52	43
Lunge, bronkier og luftrør	M	2 297	2 393	2 265	2 443	2 337	2 366	2 434	2 402	2 408	2 471
	K	2 229	2 221	2 323	2 277	2 361	2 384	2 434	2 505	2 516	2 599
Brissel	M	10	6	1-4	6	5	7	12	14	22	20
	K	1-4	7	6	1-4	1-4	1-4	10	13	27	29
Hjerte og brysthule	M	1-4	1-4	7	0	6	5	5	1-4	1-4	1-4
	K	1-4	6	1-4	5	16	9	1-4	1-4	1-4	5
Lungehinde	M	107	100	96	100	118	104	119	124	143	118
	K	18	29	18	25	31	19	24	26	22	20
Anden og dårligt specificeret lokalisation i luftveje og respirationsorganer	M	0	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	0	1-4	1-4	1-4
	K	0	0	1-4	1-4	1-4	0	1-4	0	0	0
Knogler og ledbrusk	M	37	30	39	40	35	39	30	39	53	29
	K	18	24	20	35	18	34	32	30	38	23
Modermærke	M	1 041	1 059	974	1 090	1 033	1 221	1 255	1 357	1 321	1 310
	K	1 220	1 138	1 176	1 288	1 269	1 390	1 256	1 445	1 422	1 391
Anden hud*	M	1 218	1 229	1 412	1 472	1 690	1 810	1 844	2 066	2 035	2 568
	K	994	963	1 084	1 091	1 225	1 331	1 383	1 576	1 548	2 018
Mesoteliom, anden lokalisation	M	9	9	13	11	12	10	12	17	10	10
	K	6	1-4	5	1-4	5	11	7	8	8	10
Kaposi sarkom	M	5	8	1-4	6	5	10	1-4	1-4	1-4	1-4
	K	1-4	1-4	0	1-4	1-4	0	0	0	0	1-4
Perifære nerver og autonome nervesystem	M	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	0	1-4	0	0	0
	K	1-4	1-4	1-4	0	1-4	1-4	1-4	1-4	0	1-4
Bughinde og bindevæv i bughulens bagvæg	M	13	10	20	19	13	11	21	15	16	19
	K	41	40	46	34	35	42	45	37	30	40
Andet bindevæv	M	114	83	98	105	83	97	86	109	118	101
	K	80	75	86	85	81	71	90	81	84	94
Bryst	M	31	44	31	35	42	46	36	40	54	43
	K	4 750	4 659	4 848	4 851	4 828	4 868	4 894	4 995	5 114	4 857

Ydre kvindelige køns-organer	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K	82	90	123	112	139	129	132	119	92	126
Skede	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K	19	17	16	16	20	25	24	31	28	29
Livmoderhals	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K	406	367	372	426	363	343	372	333	356	305
Livmoder	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K	804	803	844	813	849	821	806	796	835	822
Æggestok	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K	572	568	551	504	537	550	546	542	538	581
Moderkage	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K	1-4	1-4	1-4	1-4	0	1-4	1-4	1-4	1-4	0
Anden og dårligt specificeret lokalisation i kvindelige kønsorganer	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K	5	7	11	1-4	7	9	9	5	11	0
Penis	M	59	59	65	59	72	70	70	64	70	65
	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostata	M	4 394	4 423	4 370	4 690	4 603	4 621	4 454	4 661	4 516	4 460
	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Testikel	M	294	328	286	293	289	341	285	285	340	323
	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden og dårligt specificeret lokalisation i mandlige kønsorganer	M	1-4	6	1-4	1-4	12	5	9	1-4	1-4	1-4
	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyre	M	532	512	584	618	610	624	672	677	736	731
	K	271	289	292	335	348	331	301	345	311	313
Nyrebækken	M	79	71	70	65	51	66	55	48	65	67
	K	58	47	45	35	46	49	49	33	42	54
Urinleder	M	39	29	34	27	33	35	29	42	24	37
	K	25	11	15	11	10	21	14	14	12	21
Urinblære	M	1 524	1 562	1 563	1 675	1 625	1 612	1 684	1 492	1 613	1 596
	K	532	557	511	561	577	527	575	562	528	492
Anden og dårligt specificeret lokalisation i urinveje	M	48	84	78	100	94	98	111	121	117	127
	K	37	34	52	41	55	54	48	58	47	57
Øje	M	49	47	38	49	62	35	49	38	49	62
	K	47	36	53	47	52	39	49	40	62	37
Hjerne- og rygmarvshinder	M	121	148	125	151	160	213	183	221	226	208
	K	348	367	360	430	465	525	542	566	629	570

Hjerne	M	456	491	455	480	548	597	519	593	683	593
	K	358	431	397	396	469	569	517	515	688	611
Rygmarv, kranienerv og centralnervesystem	M	172	211	149	193	173	169	134	130	258	164
	K	168	184	121	148	158	164	132	172	265	162
Skjoldbruskkirtel	M	68	82	90	102	110	119	130	137	156	146
	K	203	200	205	258	255	298	312	281	332	353
Binyre	M	1-4	8	9	7	13	9	1-4	7	6	11
	K	12	10	5	9	6	8	9	11	14	12
Andre endokrine kirtler	M	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	5	1-4	1-4
	K	1-4	1-4	1-4	1-4	0	5	1-4	1-4	1-4	1-4
Hodgkin malignt lymfom	M	83	95	98	86	81	92	100	101	86	99
	K	66	61	59	55	62	71	69	63	66	75
Non-Hodgkin malignt lymfom	M	875	919	946	998	1060	1108	1125	1157	1173	1151
	K	667	652	769	825	773	861	883	831	854	901
Ondartet myeloproliferativ sygdom	M	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	0
	K	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	0	1-4	1-4	1-4	1-4
Polycytaemia vera	M	98	93	111	118	85	70	100	87	128	94
	K	71	98	97	110	87	85	92	104	127	74
Morbus myelo-proliferativus chronicus	M	63	39	63	50	69	68	85	80	73	89
	K	67	55	64	69	68	63	97	84	93	101
Thrombocytaemia essentis (haemorrhagica)	M	62	80	76	75	59	83	64	78	105	71
	K	109	118	95	98	126	122	127	109	176	110
Hypereosinofilt syndrom	M	1-4	1-4	10	7	1-4	7	6	5	21	7
	K	0	1-4	1-4	5	7	1-4	1-4	5	24	7
Lymfatisk leukæmi	M	316	321	368	399	404	384	404	357	428	399
	K	205	221	236	227	266	206	231	218	281	218
Myeloid leukæmi	M	178	177	178	181	158	171	184	187	225	192
	K	142	131	128	144	159	135	161	161	142	178
Monocytleukæmi	M	23	27	35	28	28	41	45	41	57	79
	K	15	12	22	17	20	18	25	29	39	36
Anden leukæmi	M	9	15	14	13	9	11	14	16	31	31
	K	12	10	6	7	7	8	7	10	9	22
Anden og ikke spec. lymfatisk og bloddannende væv	M	7	14	16	10	14	11	15	12	24	23
	K	1-4	6	8	9	9	9	12	8	18	19
Myelodysplastiske syndromer	M	142	182	182	184	182	193	196	190	247	213
	K	106	112	105	121	128	114	132	113	186	93
Primær og sekundær myelofibrose	M	17	52	58	46	56	53	51	43	70	67
	K	8	35	45	39	33	47	27	26	45	43

Metastaser og ikke specificeret kræft	M	365	362	391	410	424	351	382	251	159	140
	K	464	429	493	470	491	444	416	253	175	137
Anden og dårlig specificeret kræft	M	93	85	80	83	86	71	63	77	78	76
	K	109	98	95	81	83	71	71	59	61	79
Total	M	19 982	20 588	20 614	22 231	22 397	22 852	22 989	23 152	23 588	23 526
	K	19 085	18 972	19 475	20 243	20 717	20 924	21 221	21 267	22 008	21 679

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft

1-4 angiver, at tallet er diskretioneret, da der alene er 1-4 observationer i cellen. Totaler og 'Ialt' er som følge heraf afrundede til nærmeste 5 i de berørte kolonner og rækker.

Bilagstabel 20 Incidensrate fordelt på primær lokalisation for mænd (M) og kvinder (K), 2011-2020

	Køn	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Læbe	M	0,9	0,9	0,4	0,3	0,5	0,3	0,2	0,3	0,4	0,5
	K	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
Tunge	M	4,2	4,0	3,7	3,2	3,8	3,2	3,4	3,5	4,8	4,8
	K	1,7	1,9	1,8	1,5	1,5	1,4	1,4	1,9	2,1	2,2
Mundhule	M	4,2	4,4	5,4	4,9	5,0	4,9	5,1	4,2	4,3	4,7
	K	2,6	3,1	2,9	2,6	2,6	3,0	2,4	2,8	2,2	2,4
Spytkirtel	M	0,9	1,4	1,2	1,2	1,1	1,9	1,2	1,3	1,1	1,3
	K	0,9	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	0,8
Tonsil og mundsvælg	M	8,4	7,7	7,4	8,0	7,5	9,2	8,4	8,0	6,3	7,8
	K	2,2	2,9	3,1	2,7	2,9	2,6	3,1	3,1	2,4	2,3
Næsesvælg	M	0,6	0,9	0,8	0,3	0,4	0,6	0,4	0,7	0,4	0,4
	K	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Andre dele af svælg	M	2,8	2,5	3,0	2,5	2,8	2,7	2,4	2,5	2,5	2,3
	K	0,9	0,5	0,6	0,7	0,4	0,5	0,4	0,6	0,4	0,5
Anden og dårligt specificeret lokalisation i læbe, mundhule og svælg	M	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
	K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Spiserør	M	12,9	14,2	12,6	11,3	13,0	12,0	12,7	14,2	12,5	11,2
	K	4,1	4,3	3,5	4,3	3,4	4,5	4,0	4,0	4,0	3,8
Mavesæk	M	12,8	11,9	11,7	14,5	13,2	13,1	13,6	14,6	14,9	14,8
	K	6,1	5,6	5,1	5,7	6,2	6,3	6,4	5,4	5,9	5,9
Tyndtarm	M	2,7	3,2	3,0	2,5	2,7	3,5	4,1	4,3	3,6	3,9
	K	2,0	2,0	2,0	1,8	2,1	2,5	3,0	2,9	3,0	3,0
Tyktarm (inkl. colon-rectosigmoideum)	M	50,3	51,6	54,8	62,4	63,6	61,9	58,4	52,3	49,9	47,5
	K	46,0	45,7	43,3	51,4	52,3	49,3	48,6	43,1	44,8	41,2
Endetarm	M	29,9	32,4	31,2	36,9	34,6	30,6	30,9	29,0	26,4	24,4
	K	18,3	17,0	16,6	20,1	20,1	16,5	17,9	16,2	15,9	13,8
Endetarmsåbning	M	1,6	1,5	1,3	1,5	1,2	1,7	1,5	1,3	1,1	1,8
	K	3,2	3,3	3,6	3,1	2,8	2,6	3,1	3,3	2,8	3,1
Lever	M	10,0	9,2	9,6	10,1	9,7	10,5	9,8	11,3	10,5	9,5
	K	3,2	3,9	3,3	4,1	3,3	4,0	3,7	4,6	4,1	4,0
Galdeblære og galdeveje	M	3,5	3,0	2,8	3,4	3,3	3,0	3,4	2,7	3,6	2,8
	K	3,8	4,1	3,0	3,3	3,7	2,8	3,3	3,1	3,5	3,6
Bugspytkirtel	M	18,3	17,4	15,5	16,1	16,1	15,9	17,6	16,9	17,2	17,6
	K	14,0	13,6	14,5	13,4	13,1	12,2	14,6	14,9	13,8	13,8

Anden og dårligt specificeret lokalisation i fordøjelsesorganer	M	0,3	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3
	K	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2
Næsehule, mellemøre og bihuler	M	1,2	1,5	0,9	1,2	1,6	1,3	1,5	1,3	1,4	1,0
	K	0,9	1,0	0,7	0,7	0,8	1,0	1,1	0,7	0,9	0,9
Strubehoved	M	7,0	6,9	6,8	6,4	6,0	5,8	6,2	5,9	5,8	4,8
	K	2,0	1,2	1,7	1,4	1,1	1,4	1,3	1,1	1,4	1,2
Lunge, bronkier og luftrør	M	81,0	82,5	76,5	79,8	75,4	73,6	74,0	71,3	70,0	70,8
	K	68,0	66,5	68,5	65,3	66,4	65,9	65,7	66,5	65,2	66,1
Brissel	M	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,7	0,6
	K	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,8	0,8
Hjerte og brysthule	M	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
	K	0,1	0,2	0,1	0,1	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Lungehinde	M	3,7	3,3	3,2	3,3	3,8	3,3	3,6	3,6	4,2	3,3
	K	0,5	0,9	0,5	0,7	0,9	0,5	0,7	0,7	0,6	0,5
Anden og dårligt specificeret lokalisation i luftveje og respirationsorganer	M	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Knogler og ledbrusk	M	2,5	2,0	2,7	2,7	2,5	2,7	2,0	2,4	3,6	1,9
	K	1,3	1,8	1,4	2,4	1,2	2,3	2,1	1,9	2,5	1,4
Modermærke	M	37,2	37,1	33,6	36,6	34,4	40,3	40,4	42,9	41,6	40,8
	K	41,0	37,8	39,1	42,1	41,1	44,5	39,3	45,1	43,8	42,7
Anden hud*	M	48,3	47,8	53,4	54,5	60,5	62,9	62,0	68,2	64,6	78,2
	K	28,7	26,9	30,2	29,5	32,7	35,0	35,6	40,3	38,7	49,4
Mesoteliom, anden lokalisation	M	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3
	K	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3
Kaposi sarkom	M	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0
	K	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Perifære nerver og autonome nervesystem	M	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	K	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Bughinde og bindevæv i bughulens bagvæg	M	0,5	0,4	0,7	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	0,6
	K	1,3	1,2	1,4	1,0	1,0	1,2	1,3	1,0	0,8	1,1
Andet bindevæv	M	4,0	3,0	3,3	3,6	2,9	3,2	2,8	3,3	3,9	3,1
	K	2,7	2,5	2,7	2,8	2,6	2,4	2,7	2,4	2,4	2,8
Bryst	M	1,1	1,5	1,1	1,2	1,4	1,5	1,1	1,2	1,6	1,4
	K	148,7	145,3	149,2	148,6	145,4	147,2	145,7	146,8	149,2	139,6
Ydre kvindelige kønsorganer	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	K	2,6	2,7	3,6	3,2	4,2	3,7	3,7	3,3	2,5	3,3

Skede	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	K	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	0,7	0,8
Livmoderhals	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	K	14,7	13,1	13,3	15,4	12,7	12,1	13,0	11,5	12,3	10,5
Livmoder	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	K	24,7	24,2	25,1	23,6	24,2	23,4	22,6	21,7	22,7	21,9
Æggestok	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	K	18,1	17,4	16,6	14,9	15,8	15,9	15,7	15,0	14,9	16,0
Moderkage	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	K	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Anden og dårligt specificeret lokalisation i kvindelige kønsorganer	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	K	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,0
Penis	M	2,1	2,1	2,1	2,0	2,4	2,4	2,3	2,0	2,1	2,0
	K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prostata	M	149,5	146,8	142,2	147,1	142,5	140,1	133,0	135,3	128,7	124,5
	K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Testikel	M	11,3	12,8	11,2	11,4	10,9	13,1	10,7	10,7	12,6	12,0
	K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anden og dårligt specificeret lokalisation i mandlige kønsorganer	M	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1
	K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyre	M	18,0	17,3	19,4	19,8	19,4	19,3	20,5	20,5	21,9	21,2
	K	8,4	8,8	8,8	9,8	10,2	9,8	8,5	9,7	8,7	8,6
Nyrebækken	M	2,8	2,5	2,3	2,1	1,6	2,1	1,7	1,4	1,9	2,0
	K	1,8	1,4	1,3	1,0	1,3	1,4	1,3	0,8	1,0	1,4
Urinleder	M	1,3	1,0	1,1	0,9	1,1	1,2	1,0	1,3	0,7	1,1
	K	0,8	0,3	0,4	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,3	0,5
Urinblære	M	54,8	55,3	53,6	55,9	54,2	51,6	52,5	45,7	48,1	46,7
	K	16,2	16,5	14,9	16,0	16,1	14,7	15,6	15,0	13,7	12,8
Anden og dårligt specificeret lokalisation i urinveje	M	1,6	3,0	2,5	3,3	3,1	3,1	3,4	3,6	3,4	3,7
	K	1,1	1,0	1,5	1,2	1,5	1,6	1,3	1,5	1,2	1,4
Øje	M	1,7	1,6	1,2	1,6	2,0	1,2	1,6	1,2	1,6	1,9
	K	1,5	1,2	1,6	1,4	1,7	1,2	1,5	1,2	1,9	1,1
Hjerne- og rygmarvshinder	M	4,3	5,1	4,3	5,1	5,3	6,8	5,7	7,0	7,1	6,2
	K	11,1	11,6	11,2	13,3	14,1	15,7	15,9	16,6	18,0	16,5
Hjerne	M	15,9	17,4	15,8	16,4	18,3	19,9	16,9	19,1	21,8	18,6
	K	12,2	14,4	13,1	13,1	15,1	18,9	16,7	16,4	22,1	19,5

Rygmarv, kranienerver og centralnervesystem	M	5,9	7,1	5,1	6,5	5,6	5,6	4,3	4,2	8,2	5,2
	K	5,6	5,8	4,1	4,6	5,0	5,4	4,1	5,4	8,4	5,1
Skjoldbruskkirtel	M	2,3	2,8	3,1	3,5	3,7	4,0	4,3	4,4	5,0	4,7
	K	7,0	6,8	7,2	8,9	8,6	9,9	10,6	9,2	11,1	11,8
Binyre	M	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,4
	K	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4
Andre endokrine kirtler	M	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0
	K	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
Hodgkin malignt lymfom	M	2,8	3,5	3,4	3,0	2,9	3,1	3,4	3,4	2,8	3,2
	K	2,3	2,2	2,0	1,9	2,1	2,5	2,4	2,1	2,1	2,4
Non-Hodgkin malignt lymfom	M	30,6	31,5	32,6	33,5	35,0	35,5	35,3	35,8	35,1	33,8
	K	20,4	19,7	22,9	24,2	22,0	24,3	24,4	22,4	23,0	23,8
Ondartet myeloproliferativ sygdom	M	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	K	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Polycytaemia vera	M	3,5	3,3	3,6	3,9	2,7	2,3	3,2	2,7	3,9	2,8
	K	2,2	3,1	2,9	3,2	2,5	2,4	2,6	3,0	3,3	1,9
Morbus myeloproliferativus chronicus	M	2,4	1,4	2,2	1,8	2,3	2,2	2,8	2,5	2,2	2,7
	K	2,0	1,7	2,1	2,1	2,0	1,8	2,7	2,3	2,6	2,7
Thrombocytaemia essentialis(haemorrhagica)	M	2,3	3,0	2,6	2,7	2,0	2,6	2,1	2,4	3,3	2,3
	K	3,6	3,8	3,0	3,0	3,8	3,5	3,6	3,1	5,0	3,1
Hypereosinofilt syndrom	M	0,0	0,1	0,4	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,7	0,2
	K	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,2	0,7	0,2
Lymfatisk leukæmi	M	11,1	11,3	12,5	13,2	13,4	12,6	12,9	11,0	13,1	11,7
	K	6,4	6,9	7,3	6,6	7,7	6,0	6,6	6,2	7,5	5,8
Myeloid leukæmi	M	6,4	6,3	6,4	6,3	5,5	5,5	6,1	5,9	7,0	5,9
	K	4,5	4,1	3,9	4,4	4,7	4,1	4,7	4,5	4,1	4,8
Monocytleukæmi	M	0,8	1,0	1,3	1,0	1,1	1,4	1,4	1,3	1,7	2,4
	K	0,5	0,4	0,7	0,5	0,6	0,5	0,7	0,7	1,0	0,9
Anden leukæmi	M	0,3	0,6	0,5	0,5	0,3	0,3	0,4	0,5	0,9	0,9
	K	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,6
Anden og ikke spec. lymfatisk og bloddannende væv	M	0,2	0,5	0,6	0,3	0,5	0,4	0,6	0,4	0,8	0,8
	K	0,1	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,6	0,6
Myelodysplastiske syndromer	M	5,6	6,7	6,6	6,6	6,2	6,4	6,3	6,1	7,7	6,3
	K	3,2	3,3	3,1	3,6	3,6	3,2	3,7	3,0	4,8	2,3
Primær og sekundær myelofibrose	M	0,6	1,8	2,0	1,5	1,8	1,7	1,6	1,3	2,1	2,0
	K	0,3	1,0	1,3	1,2	0,9	1,3	0,7	0,7	1,2	1,2
Metastaser og ikke specifiseret kræft	M	13,8	13,3	13,7	14,2	14,2	11,3	12,3	7,8	4,8	4,2
	K	13,8	12,7	14,2	13,6	13,7	12,4	11,3	6,7	4,5	3,5

Anden og dårlig specificeret kræft	M	3,4	3,2	2,7	2,7	2,9	2,4	2,0	2,4	2,5	2,3
	K	3,3	2,8	2,8	2,4	2,3	1,9	2,0	1,5	1,6	1,9
Total	M	706,5	715,1	702,0	736,8	729,2	728,3	716,4	708,5	708,4	692,5
	K	594,4	582,7	590,5	605,0	607,3	611,3	607,1	599,9	614,8	594,8

Kilde: Cancerregisteret pr. 18. november 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: *Ekskl. basalcelle hudkræft