

Juni 2007

Vallensbæk Kommune



**Indsatsplan for bekæmpelse af
kæmpebjørneklo
i
Vallensbæk Kommune**

Indledning

Kæmpebjørneklo, som alle kender for de store flotte blomsterskærme blev indført til Danmark i 1800 tallet fra Kaukasus, er efterhånden blev et stort problem både på offentlige og private arealer, fordi den er rimelig aggressiv og invasiv, der gør, at den fortrænger det naturlige dyre- og planteliv. Endvidere indeholder den en saft, som kan give voldsomme udslæt på mennesker, hvis den kommer på huden.

Udbredelsen af kæmpebjørnekloen har i en årrække være i voldsom vækst, fordi frøene er spiredygtige i mange år, og derfor er en kontinuerlig bekæmpelse meget nødvendig. Planten spredes effektivt langs vandløb, søer og veje, og det er derfor altafgørende, at bekæmpelsen koordineres på tværs af kommunegrænser og matrikelgrænser.

Vallensbæk Kommune vil derfor også i fremtiden foretage intensiv bekæmpelse af planten i samarbejde med nabokommunerne.

Faktuelle oplysninger

Der foregår allerede i dag en effektiv bekæmpelse på kommunens arealer, og det er planen at kæmpebjørnekloen skal forsøges helt udryddet, eller højst forekomme i absolut minimalt omfang. Det er derfor altafgørende at planten bekæmpes intensivt på både offentlige og private arealer.

Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af denne kommunale indsatsplan, åbner "Bekendtgørelse nr. 17 af 13. januar 2006", om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, mulighed for, at kommunen, til forskel fra tidligere lovgivning, kan pålægge ejere af respektive arealer, altså også private, at foretage bekæmpelse af planten.

Indsatsområde

Hele Vallensbæk Kommune er udpeget som indsatsområde, med baggrund i at kunne udøve myndighed med pålæg om bekæmpelse på private arealer, uanset hvor i kommunen planten vil forekomme.

Vallensbæk Kommune har i de foregående år foretaget intensiv bekæmpelse på mange forskellige lokaliteter, men specielt koncentreret i moseområderne, langs St. Vejleå, og på skrænterne langs motorvejene, hvor de største forekomster er lokaliseret.

Denne intensive bekæmpelse er af afgørende betydning for en effektiv udryddelse af planten, også for at den ikke skal spredes yderligere. Derfor vil bekæmpelsen fortsætte systematisk i fremtiden.

Bekæmpelsesmetoder

Overordnet bekæmpelsesstrategi.

Kæmpebjørneklo skal bekæmpes effektivt, således at den enkelte plante dør, og på intet tidspunkt reproducerer sig selv. Dvs. at frøsætning og frøspredning forhindres. Den hurtigste og sikreste metode bør altid vælges, hvor det er muligt.

Rodstikning

Rodstikning udføres i april – maj måned, mens planterne endnu er små. Ved rodstikning skæres plantens rod over ca. 10 cm under jorden f. eks. med en spade, hvorefter planten trækkes op, og blomsterskærmen bortskaffes.

Skærmkapning

Ved mindre forekomster kan blomsterskærmene klippes af i juni måned. Skærmene emballeres i tætte poser. Planter og skærme kan bortskaffes til kommunale haveaffaldsordninger, da professionelle komposteringsanlæg drives ved temperaturer, der dræber frøene. Hjemmekompostering kan ikke anbefales. Når planteaffaldet håndteres og transporteres, skal der sørges for sikring mod frøspredning og mod hudkontakt.

Slåning med le

Planterne kan slås med le, når de er ca. ½ meter høje. Slåningen skal gentages flere gange om året, da planterne sætter nye skud, og kan producere frø fra ret lave planter.

En anden mulighed er at vente til lige inden planterne blomstrer. Så vil de have brugt så meget energi på at vokse sig store, at mange af dem dør, når de fældes. Man skal dog stadig holde øje med, om der kommer nye skud.

Hvis man kommer for sent i gang, kan frøene eftermodne på den fældede plante, og så være spiredygtige alligevel.

Buskrydder med snøre bør undgås, da den hvirvler en tåge af giftig plantesaft op.

Kemisk bekæmpelse

Kemisk bekæmpelse bør så vidt muligt undgås. Kan bekæmpelse ikke med rimelighed udføres ved anden metode, skal den foretages af uddannede personer.

Græsning

Kæmpebjørneklo i store bestande og på store arealer kan bekæmpes effektivt ved afgræsning af får og kvæg. Arealet skal indhegnes og dyrene sættes ud i april – maj. Der meget vigtigt at bekæmpe eventuelle planter udenfor hegnet.

Frister for bekæmpelse

Ejere af offentlige eller private arealer er pligtige til at foretage 3 årlige bekæmpelser.

1. bekæmpelse skal være udført i maj.
2. bekæmpelse skal være udført i juni.
3. bekæmpelse skal være udført i juli.

Senere på sæsonen bør man kontrollere, at der ikke er planter der har "undgået" de første bekæmpelser.

Husk plantens giftige virkning!!

At røre en kæmpebjørneklo kan give varige skader i form af hududslæt. Udslættet opstår, fordi planten indeholder en saft, der bliver giftig, når solen skinner på det berørte hudområde.

I direkte sollys, udvikles der væskefyldte blærer, der kan forårsage vedvarende udslæt. Enhver form for hudkontakt med planten bør derfor undgås.

Det anbefales at bruge handsker og dækkende vandtæt tøj, ligesom ansigtet skal beskyttes.

Da det er sollyst, der er med til at fremme giftigheden af plantesaften, er det sikrest at bekæmpe når det er overskyet.

Indsatsplanen træder i kraft den 1. juli 2007. / Kommunalbestyrelsen

